

14. 花序通常被毛;叶片中部以上最宽;果球形,径不超过7毫米.....  
 .....14. 滨木犀榄 *O. brachiata* (Lour.) Merr. ex G. W. Groff, Ding & E. H. Groff  
 1. 花无花冠(组 2. 裸花组 Sect. *Gymnelaea* Endl.) .....  
 .....15. 喜马拉雅木犀榄 *O. gamblei*, C. B. Clarke

组 1. 木犀榄组——Sect. *Olea*——Sect. *Euclaea* Endl. Gen. 572. 1838.

花具花冠;雄蕊着生于花冠管上。

约 30 余种。我国产 14 种, 1 亚种, 1 变种, 其中 1 种及 1 亚种系栽培。

1. 腺叶木犀榄(植物分类学报) 滇榄树(中国树木分类学) 图版 34: 1—2

*Olea glandulifera* Wall. ex G. Don, Gen. Hist. Dichlam. Pl. 4: 49. 1837; Wight, Ic. Pl. Ind. Or. 4: 11, t. 1238. 1850; Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 612. 1882; 陈嵘, 中国树木分类学 1023. 1937; Brandis, Ind. Trees 446, f. 170. 1906; Chia in Acta Phytotax. Sin. 3: 340. 1954; L. Johnson in Contr. N. S. W. Nat. Herb. 2(6): 407. 1957, in nota; Hara in Enum. Fl. Pl. Nepal 3: 82. 1982; 云南植物志 4: 634, 图版 179, 1—2. 1986.

乔木, 高 6—20 米; 树皮灰白色。枝灰色或灰褐色, 近圆柱形, 小枝扁平, 灰白色或褐色, 粗糙, 散生白色圆形或椭圆形皮孔, 无毛, 节扁平而膨大。叶片纸质, 卵状椭圆形、椭圆形或椭圆状披针形, 长 8.5—18 厘米, 宽 3.5—6.5 厘米, 先端渐尖至长渐尖, 基部楔形或宽楔形, 全缘, 叶缘稍反卷, 上面深绿色, 无光泽, 下面淡绿色, 具白色微小鳞片, 中脉在上面稍凹入, 下面凸起, 侧脉 10—15 对, 两面微凸起, 下面脉腋内有凹陷具睫毛的腺体; 叶柄长 1.5—3 厘米, 上面具窄而深的沟, 无毛。圆锥花序顶生或腋生, 长 8—10 厘米, 无毛; 花梗长 0—3 毫米; 花白色, 两性; 花萼短, 长约 1 毫米, 裂片呈三角形, 锐尖, 边缘被微柔毛或无毛; 花冠深裂, 裂片椭圆形, 长 1—2 毫米, 先端钝; 花药大, 宽椭圆形, 花丝短, 带状; 子房被微柔毛或无毛, 卵球形, 柱头较大, 头状, 2 裂。果长卵形, 稍歪斜, 长 1.2—1.5 厘米, 径 6—7 毫米, 先端尖, 成熟时黄褐色, 粗糙; 果梗长 2—6 毫米。花期 4—5 月, 果期 7—11 月。

产于云南。生潮湿沟谷及开阔山谷, 海拔 1 200—2 400 米。也分布于印度南部、斯里兰卡、巴基斯坦、喀什米尔及尼泊尔等地。模式标本采自尼泊尔。

2. 木犀榄(植物分类学报) 油橄榄(俗称), 齐墩果(酉阳杂俎)

*Olea europaea* Linn. Sp. Pl. 8. 1753; Boiss. Fl. Orient. 4: 36. 1879; 陈嵘, 中国树木分类学 1023. 1937; Chia in Acta Phytotax. Sin. 3: 339. 1954; 中国高等植物图鉴 3: 359, 图 4671. 1974; 云南植物志 4: 632. 1986.

2a. 木犀榄(原亚种)

subsp. *europaea*

常绿小乔木, 高可达 10 米; 树皮灰色。枝灰色或灰褐色, 近圆柱形, 散生圆形皮孔, 小