

枝具棱角,密被银灰色鳞片,节处稍压扁。叶片革质,披针形,有时为长圆状椭圆形或卵形,长1.5—6厘米,宽0.5—1.5厘米,先端锐尖至渐尖,具小凸尖,基部渐窄或楔形,全缘,叶缘反卷,上面深绿色,稍被银灰色鳞片,下面浅绿色,密被银灰色鳞片,两面无毛,中脉在两面凸起或上面微凹入,侧脉不甚明显,5—11对,在上面微凸起;叶柄长2—5毫米,密被银灰色鳞片,两侧下延于茎上成狭棱,上面具浅沟。圆锥花序腋生或顶生,长2—4厘米,较叶为短;花序梗长0.5—1厘米,被银灰色鳞片;苞片披针形或卵形,长0.5—2毫米;花梗短,长0—1毫米;花芳香,白色,两性;花萼杯状,长1—1.5毫米,浅裂或几近截形;花冠长3—4毫米,深裂几达基部,裂片长圆形,长2.5—3毫米,宽约1.5毫米,先端钝或锐尖,边缘内卷;花丝扁平,长约1毫米,花药卵状三角形,长1.8—2毫米;子房球形,无毛,花柱短,长约0.3毫米,柱头头状,2裂。果椭圆形,长1.6—2.5厘米,径1—2厘米,成熟时呈蓝黑色。花期4—5月,果期6—9月。

可能原产于小亚细亚,后广栽于地中海地区,现全球亚热带地区都有栽培。我国长江流域以南地区亦栽培。

果可榨油,供食用,也可制蜜饯。

2b. 非洲木犀榄(亚种)

subsp. *africana* (Mill.) P. S. Green in Kew Bull. 34: 69. 1979. — *O. africana* Mill. Gard. Dict. ed. 8, Olea 4. 1768. — *O. chrysophylla* Lam. Tab. Encycl. 1: 29. 1791 et Encycl. 4: 544. 1798. — *O. ferruginea* Hort. ex Steud. Nom. ed. 2, 2:209. 1841, nom. nud., non Royle 1835.

与原亚种区别在于本亚种的植株被锈色鳞片;叶片较大,长2—9厘米,宽0.7—1.5(—3)厘米,侧脉在近叶缘处明显汇合成一条线;果较小,圆形或长圆形,长约1厘米,有时具小尖头。

原产非洲,现广泛栽培作木犀榄的砧木。我国也有栽培。

3. 锈鳞木犀榄 尖叶木犀榄(植物分类学报) 图版 34: 3—4

Olea ferruginea Royle, Ill. Bot. Himal. 267, t. 65, f. 1. 1839; Bor, Man. Ind. For. Bot. 278. 1953; Hara in Enum. Fl. Pl. Nepal 3:82. 1982; 云南植物志 4: 632, 图版 179, 3—4. 1986. — *O. cuspidata* Wall. ex G. Don, Gen. Hist. Dichlam. Pl. 4: 49. 1837; DC. Prodr. 8:285. 1844; Brandis, For. Fl. 307, t. 38. 1874; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 611. 1882; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1: 214. 1924; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:1008. 1936; Chia in Acta Phytotax. Sin. 3:340. 1954; 中国高等植物图鉴 3: 358, 图 4670. 1974.

灌木或小乔木,高3—10米。枝灰褐色,圆柱形,粗糙,小枝褐色或灰色,近四棱形,无毛,密被细小鳞片。叶片革质,狭披针形至长圆状椭圆形,长3—10厘米,宽1—2厘米,先端渐尖,具长凸尖头,基部渐窄,叶缘稍反卷,两面无毛或在上面中脉被微柔毛,下面密被