

锈色鳞片,中脉在上面凹入,下面凸起,侧脉多对,不甚明显,两面微凸起,在近叶缘处汇合成一直线;叶柄长3—5毫米,被锈色鳞片,无毛。圆锥花序腋生,长1—4厘米,宽1—2厘米;花序梗长4—11毫米,具棱,稍被锈色鳞片;苞片线形或鳞片状,长约1毫米;花梗长0—1毫米;花白色,两性;花萼无毛,小,杯状,长约1毫米,裂齿,极短,宽三角形或近截形;花冠长2.5—3.5毫米,花冠管与花萼近等长,裂片椭圆形,长1.5—2毫米,宽约1.5毫米;花丝极短,花药长椭圆形,长约1.5毫米,内藏,稍短于花冠裂片;子房近圆形,无毛,花柱短,与花冠管近等长,柱头头状。果宽椭圆形或近球形,长7—9毫米,径4—6毫米,成熟时呈暗褐色;果梗长1—5毫米。花期4—8月,果期8—11月。

产于云南。生林中或河畔灌丛,海拔600—2800米。印度、巴基斯坦、阿富汗、喀什米尔等地也有分布。模式标本采自印度东北部。

4. 小叶木犀榄 麦皮树(海南吊罗山),小叶李榄(植物分类学报)

Olea parvilimba (Merr. & Chun) Miao, comb. nov. — *Linociera parvilimba* Merr. & Chun in *Sunyatsenia* 5:169, pl. 26. 1940; Chia in *Acta Phytotax. Sin.* 3:349. 1954; 海南植物志 3: 216. 1974.

乔木,高12—15米;树皮灰色或灰棕色,纵裂。枝灰黑色或灰白色,圆柱形,粗糙,小枝稍压扁,褐色或灰白色,无毛,被圆形或长圆形皮孔,节处压扁状。叶片硬革质,椭圆形或长圆状椭圆形,长3.5—9厘米,宽1.2—3.2厘米,先端钝,基部渐窄,全缘,叶缘强烈反卷,上面深绿色,光亮,下面淡绿色,两面无毛,具黄色的腺点,脱落后成凹点,中脉在上面凹入,下面凸起,侧脉5—7对,两面微凹入;叶柄长3—10毫米,上面平坦,无毛。圆锥花序顶生或近顶生,长1.5—2厘米,无毛;花梗长1—1.5毫米;花黄绿色,两性;花萼长约1毫米,裂片卵圆形,长约0.5毫米,边缘具睫毛;花冠长约2毫米,裂片长卵形,长1—1.3毫米,先端圆或钝,盔状;花丝短,花药椭圆形,长约0.5毫米;子房卵球形,花柱短,柱头头状。果长椭圆形,长1.2—1.4厘米,径约5.5毫米,两端尖,干时有纵肋。花期9月,果期9—12月。

产于海南。生山顶林中,海拔约1000米。模式标本采自海南保亭。

本种无论从叶形、花冠形状以及果实具胚乳等特征均较之李榄属更接近于木犀榄属。

5. 尾叶木犀榄(植物分类学报) 多脉桂花(云南种子植物名录)

Olea caudatilimba Chia in *Acta Phytotax. Sin.* 3:339, pl. 1—4. 1954. — *Osmanthus polyneurus* P.Y. Bai in *Acta Bot. Yunnan.* 5:179, f. 1—5. 1983; 云南植物志 4: 622, 图版 176, 6—10. 1986.

小乔木,高3—8米。枝灰色或灰白色,圆柱形,无毛或近无毛,小枝稍压扁,淡褐色,被微柔毛,疏被圆形皮孔。叶片革质,长圆状椭圆形或椭圆状披针形,长5.5—9厘米,宽2—3.5厘米,先端渐尖至尾状渐尖,具钝头,基部楔形或宽楔形,全缘,叶缘稍反卷,两面光滑无毛,上面光亮,橄榄绿色,下面淡绿色,中脉在上面凹入,下面凸起,侧脉纤细,10—