

毛。圆锥花序顶生或腋生,长 2—7.5 厘米,被短柔毛或毛脱落;花白色或黄色,杂性异株;花梗长 1—3 毫米。雄花序梗及花梗纤细;花萼长 0.5—1 毫米,裂片宽卵状三角形,先端锐尖或钝,边缘具微小睫毛,疏生黄褐色腺点;花冠长 1.5—2.5 毫米,裂片卵圆形,长 0.5—0.7 毫米;花丝极短,花药椭圆形,长约 1 毫米。两性花的花序梗较粗;花萼长 1—1.5 毫米,裂片卵状三角形,先端锐尖或钝,边缘具睫毛;花冠长 2.5—3.5 毫米,具黄褐色腺点,裂片卵圆形,长 1—1.5 毫米,先端盔状;子房卵球形,无毛,花柱几无,柱头头状,2 裂。果长椭圆形,长 1.4—1.8 厘米,径 7—9 毫米,两端稍钝,呈紫黑色或紫红色,干时有纵沟 8—10 条;果梗短粗,长 3—5 毫米。花期 10—11 月,果期 11 月至翌年 4 月。

产于海南。生海拔 700 米以下的山谷密林中或疏林溪旁。模式标本采自海南陵水。

10. 红花木犀榄(植物分类学报) 图版 36: 1—3

Olea rosea Craib in Kew Bull. 1911:411. 1911; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo chine 3:1076. 1933; Chia in Acta Phytotax. Sin. 3:342. 1954; 云南植物志 4:634, 图版 179, 5—6. 1986. — *O. densiflora* Li in Journ. Arn. Arb. 25: 314. 1944. — *Linociera menghaiensis* H.T. Chang in Act. Sci. Nat. Univ. Sunyatsen. 1982:2. 1982.

灌木或小乔木,高 2—15 米。枝灰白色或灰褐色,圆柱形,密被柔毛,后渐脱落,小枝黄褐色或褐色,圆柱形,节处稍压扁,密被短柔毛。叶片革质,披针形、长圆状披针形或卵状椭圆形,长 7—17.5 厘米,宽 2—6.5 厘米,先端渐尖至尾状渐尖,基部楔形或宽楔形,常全缘,有时具不规则的疏锯齿,叶缘稍反卷,两面橄榄色,上面沿中脉被微柔毛,下面沿中脉和侧脉密被柔毛,其余散生柔毛,有时几无毛,中脉在上面凹入,下面凸起,侧脉 6—10 对,上面凹入,下面明显凸起;叶柄长 0.5—1.5 厘米,密被柔毛或变无毛。圆锥花序顶生或腋生,密被黄色柔毛;花杂性异株。雄花序长 2.5—14 厘米,宽 2.5—7 厘米,花梗及花序分枝纤细,被柔毛;苞片线形,长 0.5—5 毫米;花梗长 0.5—2 毫米;雄花黄白色,干时玫瑰红色;花萼被柔毛,裂片卵形,长 0.5—1 毫米,先端钝或圆;花冠长 1.5—2.5 毫米,花冠管长 1—2 毫米,裂片短,近圆形长 0.5—1 毫米,先端盔状;花丝极短,花药宽卵形,长约 1 毫米。两性花的花序通常长 1.2—3 厘米,稀达 10 厘米,花序分枝及花梗较粗壮;花梗长 0—2 毫米;花萼和雄花同;花冠长 3—4 毫米,裂片圆形,长 0.5—1 毫米,先端盔状;花丝近无,花药近圆形,长约 1 毫米;子房长椭圆形,无毛,花柱短,柱头 2 裂。果长椭圆形,长 1.2—1.7 厘米,径 5—6 毫米,成熟时红紫色,干时具不明显的纵肋。花期 2—9 月,果期 7—11 月。

产于云南。生山谷湿润密林中,海拔 760—1 750 米。越南、老挝、柬埔寨、泰国也有分布。等模式标本采自泰国及云南思茅。

根据 *Linociera menghaiensis* 的模式标本(中苏队 9568, PE),此种无疑属本种。

11. 云南木犀榄(植物分类学报) 干状木犀榄、短柄木犀榄(植物分类学报), 旱生木犀榄(中国高等植物图鉴), 白桂花(云南) 图版 36: 4—7



1—3. 红花木犀榄 *Olea rosea* Craib, 1. 花枝; 2. 花冠展开; 3. 具全缘叶。4—7. 云南木犀榄 *O. yuennanensis* Hand. -Mazz., 4. 花枝; 5. 花冠展开; 6. 果枝; 7. 具锯齿叶。(陆锦文绘)