

或紫黑色。花期 3—7 月,果期 5—12 月。

产于广东、广西、贵州东南部、云南南部。生海拔 2300 米以下的林中、山谷、海边丛林等。印度、缅甸、越南也有分布。模式标本采自印度东部。

13b. **球果木犀榄**(变种) 魏氏木犀榄(植物分类学报)

var. wightiana (Wall. ex G. Don) DC. Prodr. 8: 286. 1844, “ β ”.——*O. wightiana* Wall. ex G. Don, Gen. Hist. Dichlam. Pl. 4: 49. 1837; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 3: 1078. 1933; Chia in Acta Phytotax. Sin. 3: 347. 1954.

与原变种区别在于本变种的果较大,球形或近球形,长 1.1—1.3 厘米,径 1—1.1 厘米。果期 7—12 月。

产于广东、广西。生海拔 1000 米左右的疏、密林中或溪边、山顶。模式标本采自印度东部。

14. **滨木犀榄**(植物分类学报) 白茶木(广东) 图版 37: 4—5

Olea brachiata (Lour.) Merr. ex G. W. Groff, Ding & E. H. Groff in Lingn. Agr. Rev. 2: 127. 1925; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 147. 1927, 15: 424. 1936. et in Trans. Amer. Philos. Soc. n. s. 24: 307. 1935; Chia in Acta Phytotax. Sin. 3: 347. 1954; 海南植物志 3: 214. 1974; R. Kiew in Blumea 25: 308. 1979.——*Tetrapilus brachiatus* Lour. Fl. Cochinch. 611. 1790, ed. Willd. 750. 1793; DC. Prodr. 8: 299. 1844; Johnson in Contr. N. S. W. Nat. Herb. 2: 408. 1957. ——*Olea maritima* Wall. ex G. Don, Gen. Hist. Dichlam. Pl. 4: 49. 1837; C.B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 612. 1882; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 3: 1078. 1933.

灌木,高 1—9 米;树皮灰色。枝灰白色或灰褐色,圆柱形,小枝灰色或灰褐色,圆柱形,稍粗糙,通常被微柔毛,节处压扁。叶片革质,椭圆形、长椭圆形或椭圆状披针形,长 3—8 厘米,宽 1.2—3(—4) 厘米,通常中部以上最宽,先端渐尖至短尾状渐尖,基部楔形,叶缘中部以上具不规则锯齿,稀全缘,上面深绿色,下面淡绿色,除中脉上面常被微柔毛外,其余无毛,中脉在上面凹入,下面凸起,侧脉 5—7 对,不甚明显,下面微凹入;叶柄长 3—5 毫米,通常被微柔毛或变无毛。花序腋生,圆锥状,有时成总状或伞状,长 0.5—3 厘米,常被柔毛;花白色,杂性异株。两性花长 2—2.5 毫米;花梗长 1—1.5 毫米,被短柔毛或近无毛;花萼长约 1 毫米,被微柔毛,裂片宽卵形或尖三角形,长约 0.5 毫米;花冠管长 1—1.5 毫米;花冠裂片卵圆形,长 0.5—1 毫米,盔状;雄蕊近无花丝,花药椭圆形,长约 0.8 毫米;子房卵球形,无毛,柱头头状,微 2 裂。果球形,径 5—7 毫米,成熟时紫黑色或蓝紫色。花期 10 月至翌年 3 月,果期 6—8 月。

产于广东、海南及东南亚地区。生海拔 700 米以下的低海拔的丛林中及灌丛中。模式标本采自越南。