

-29. 卵叶女贞 *L. ovalifolium* Hassk.
 30. 圆锥花序长 10—18 厘米, 宽 8—16 厘米; 叶片长圆状椭圆形、长圆状披针形或倒卵状椭圆形至倒卵形..... 30. 扩展女贞 *L. expansum* Rehd.
 1. 果熟时开裂[组 2. 裂果女贞组 Sect. *Sarcocarpion* (Franch.) Mansf.]
31. 裂果女贞 *L. sempervirens* (Franch.) Lingelsh.

组 1. 女贞组——Sect. *Ibota* Koehne in Ascherson-Festschr. 1904: 189. 1904.——Sect. *I.* Decne. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris ser. 2, 2: 17. 1879.——Sect. *II.* Decne. l. c. 20. 1879, excl. *L. vulgare* Linn.——Sect. *Vulgare* Höfk. in Mitt. Deutsch. Dendr. Ges. 24: 56. 1915, excl. *L. vulgare* Linn.——Sect. *Subdrupaceae* Mansf. in Bot. Jahrb. 59, Beibl. 132: 40. 42. 1924. “Supdrupaceae”

落叶或常绿、半常绿的灌木、小乔木或乔木。叶片纸质或革质。果为浆果状核果。

约 40 种。我国产 28 种、1 亚种、9 变种、1 变型, 其中 2 种系栽培。

1. 倒卵叶女贞(植物分类学报) 图版 38: 1

Ligustrum obovatilimbum Miao in Acta Phytotax. Sin. 23(1): 55. 1985; M. C. Chang & B. M. Miao in Investigat. Stud. Nat. 6: 34. 1986.

灌木, 高 1—2 米。枝灰色, 圆柱形, 无皮孔, 小枝褐色, 粗壮, 近圆柱形, 光亮, 无毛, 节处压扁。叶片革质, 常绿, 倒卵状披针形至长圆状披针形, 长 5.5—8 厘米, 宽 2—2.5 厘米, 先端锐尖、钝或圆, 基部向叶柄渐窄, 叶缘反卷, 上面深绿色, 无毛, 下面淡绿色, 密被细小腺点, 中脉在上面微凹入或平, 下面明显凸起, 侧脉 5—7 对, 两面微凸起, 在近叶缘处弯曲呈不明显汇合, 细脉不明显; 叶柄粗壮, 长 5—7 毫米, 具窄翅, 上面具沟, 光滑无毛。果序圆锥状, 顶生, 无毛, 长约 13 厘米, 宽约 12 厘米; 果序梗长 2.5—3 厘米, 四棱形, 第二级最下分枝长达 6 厘米, 明显具棱, 第三级分枝通常长约 4 毫米, 稀达 1.5 厘米; 宿存花萼无毛, 4 裂, 裂片卵形。果椭圆形, 长 5—6 毫米, 径约 4 毫米, 被白粉; 果梗四棱形, 长 2—3 毫米; 种子单生。 果期 12 月。

产于广东罗浮山。生海拔 230 米的开旷地。模式标本采自该地。

与华女贞 *L. lianum* Hsu 区别在于本种植株光滑无毛; 叶片倒卵状披针形至长圆状披针形, 先端锐尖、钝或圆; 果较小。

2. 细女贞(云南种子植物名录) 酸姜木(四川康定) 图版 38: 2—3

Ligustrum gracile Rehd. in Sargent, Pl. Wils. 2: 602. 1916; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 1010. 1936; M. C. Chang & B. M. Miao in Investigat. Stud. Nat. 6: 34, pl. 2, f. 1—2. 1986; 云南植物志 4: 642. 1986. ——*L. quihoui* Carr. var. *glabrum* Mansf. in Bot. Jahrb. 59, Beibl. 132: 64. 1924. ——*L. compactum* var. *glabrum* (Mansf.) Hand.-Mazz. l. c. 7: 1009. 1936; 中国高等植物图鉴 3: 361. 1974; 云南植物志 4: 642. 1986.



1.倒卵叶女贞 *Ligustrum obovatilimbum* Miao, 果枝。2—3. 细女贞 *L. gracile* Rehd., 2. 花枝; 花。4—5. 小叶女贞 *L. quihoui* Carr., 4. 花枝; 5. 花。(陆锦文绘)