

灌木,高0.5—3米。枝圆柱形,开展,幼枝紫色、淡褐色至灰色,向基部常被微柔毛,皮孔圆形,散生。叶片凋落,纸质,披针形或线状披针形,稀为长圆状披针形或椭圆状披针形,长1—4(—8.5)厘米,宽0.3—0.8(—2.5)厘米,先端渐尖或圆钝而具小尖头,基部楔形或钝圆,叶缘稍反卷,两面光滑无毛,上面深绿色,下面淡绿色,被细小黄色腺点,老时脱落,中脉在上面微凹入,下面凸起,侧脉3—10对,在两面均不明显或几不明显;叶柄细,长1—4(—8)毫米,无毛。圆锥花序顶生或腋生,长5—13厘米,宽1.5—10厘米;花序梗长0—2厘米;花序轴纤细,上部四棱形,近基部圆柱形,无毛;花序基部或近基部的苞片小叶状,长达2.5厘米,小苞片线形,长1—5毫米;花无梗或具短梗,梗长不超过1毫米;花萼无毛,长1—1.5毫米,近截形或萼齿宽三角形;花冠长3—5.5毫米,花冠管长2—2.5毫米,裂片椭圆状卵形,长2—3毫米,先端略尖,兜状,开展;花丝极短,长0.5—1毫米,花药黄色,长圆形,长1.5—2.5毫米,较花冠裂片稍短或略伸出,直立或近直立;花柱长约1毫米。果倒卵形,长5—7毫米,径3—5毫米,呈蓝黑色;果梗长0—3毫米。花期5—8月,果期8—11月。

产于四川、云南。生海拔800—3800米的山坡灌丛中。模式标本采自四川小金。

3. 小叶女贞(南京,中国树木分类学) 图版38:4—5

Ligustrum quihoui Carr. in Rev. Hort. Paris **1869**: 377. 1869; Decne. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris ser. 2, **2**: 35. 1879; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 92. 1889; Schneid. Ill. Handb. Laubh. **2**: 801, f. 502 k-l. 1911; Höfk. in Mitt. Deutsch. Dendr. Ges. **24**: 60, t. 5. 1915; Rehd. in Sargent, Pl. Wils. **2**: 607. 1916 et in Journ. Arn. Arb. **15**: 305. 1934 et Bibl. Cult. Trees & Shrubs 573. 1949; Mansf. in Bot. Jahrb. 59, Beibl. **132**: 63. 1924; O. Stapf in Curtis's Bot. Mag. **154**: t. 9202. 1930; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 1011. 1936; 陈嵘,中国树木分类学 1027. 1937; Y. C. Yang in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China Bot. Ser. **12**: 111. 1939; 中国高等植物图鉴**3**: 362,图4678. 1974; Lauener & P. S. Green in Not. Bot. Gard. Edinb. **37**(1): 128. 1978; M. C. Chang & B. M. Miao in Investigat. Stud. Nat. **6**: 41, pl. 1, f. 5—6. 1986; 云南植物志**4**: 642, 图版181, 1—3. 1986; 西藏植物志**3**: 885, 图340, 1—5. 1986. —*L. brachystachyum* Decne. l. c. ser. 2, **2**: 34. 1879, "brachystachium"; Franch. Pl. David. **1**: 205. 1883; Hemsl. l. c. **26**: 89. 1889; Diels in Bot. Jahrb. **29**: 533. 1900; Rehd. l. c. **2**: 607. 1916. —*L. argyi* Lévl. in Mem. Acad. Ci. Art. Barcelona ser. 3, **12**(22): 557. 1916. —*L. quihoui* var. *brachystachyum* (Decne.) Hand.-Mazz. l. c. **7**: 1011. 1936. —*L. quihoui* var. *trichopodium* Y. C. Yang, l. c. **12**: 112. 1939.

落叶灌木,高1—3米。小枝淡棕色,圆柱形,密被微柔毛,后脱落。叶片薄革质,形状和大小变异较大,披针形、长圆状椭圆形、椭圆形、倒卵状长圆形至倒披针形或倒卵形,长

1—4(—5.5) 厘米,宽 0.5—2(—3) 厘米,先端锐尖、钝或微凹,基部狭楔形至楔形,叶缘反卷,上面深绿色,下面淡绿色,常具腺点,两面无毛,稀沿中脉被微柔毛,中脉在上面凹入,下面凸起,侧脉 2—6 对,不明显,在上面微凹入,下面略凸起,近叶缘处网结不明显;叶柄长 0—5 毫米,无毛或被微柔毛。圆锥花序顶生,近圆柱形,长 4—15(—22) 厘米,宽 2—4 厘米,分枝处常有 1 对叶状苞片;小苞片卵形,具睫毛;花萼无毛,长 1.5—2 毫米,萼齿宽卵形或钝三角形;花冠长 4—5 毫米,花冠管长 2.5—3 毫米,裂片卵形或椭圆形,长 1.5—3 毫米,先端钝;雄蕊伸出裂片外,花丝与花冠裂片近等长或稍长。果倒卵形、宽椭圆形或近球形,长 5—9 毫米,径 4—7 毫米,呈紫黑色。花期 5—7 月,果期 8—11 月。

产于陕西南部、山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、四川、贵州西北部、云南、西藏察隅。生沟边、路旁或河边灌丛中,或山坡,海拔 100—2500 米。根据中国植物发表的。

叶入药,具清热解毒等功效,治烫伤、外伤;树皮入药治烫伤。

4. 斑叶女贞(植物分类学报) 图版 39:1—3

Ligustrum punctifolium M. C. Chang in Acta Phytotax. Sin. 23(1): 53. 1985; M. C. Chang & B. M. Miao in Investigat. Stud. Nat. 6: 36, pl. 3, f. 1—3. 1986. — *L. quihoui* auct. non Carr. 1869: Merr. & Chun in Sunyatsenia 1: 79. 1930, quoad Y. Tsiang 2933. — *L. retusum* auct. non Merr. 1935: Li in Journ. Arn. Arb. 24: 373. 1943, quoad W. T. Tsang 30664, sphalm. 30644.

灌木,高约 2 米。枝灰棕色,小枝灰黄色,均为圆柱形,被微柔毛。叶片革质,椭圆状长圆形、卵形或倒卵形,长 1—2 厘米,宽 0.8—1.2 厘米,先端钝或微凹,有时锐尖,基部楔形、宽楔形至近圆形,上面深绿色,无毛或沿中脉被微柔毛,散生斑状腺点,下面淡绿色,无毛,密被褐色斑状腺点,侧脉 2—3 对,不明显或在上部微凸起,近叶缘处不明显网结;叶柄长 0—2 毫米,被微柔毛。圆锥花序生小枝顶端,长约 5 厘米,宽约 2 厘米;花序轴被微柔毛;花梗长 0.5—1.3 毫米,无毛;花萼长约 1.5 毫米,无毛,截形或具波状齿;花冠长 8—9 毫米,花冠管长 4—5 毫米,裂片椭圆形,长 3.5—4 毫米,宽约 1.5 毫米,先端锐尖或略呈兜状;雄蕊几与花冠裂片等长或略短,花丝长 2—2.5 毫米,短于花冠裂片,花药长圆形,长约 2 毫米。果近球形,径约 4 毫米。花期 8 月,果期 10 月。

产于我国香港。生潮汐所致的平坦地。越南也有分布。模式标本采自香港。

与凹叶女贞 *L. retusum* Merr. 和小叶女贞 *L. quihoui* Carr. 的区别在于本种叶片下面密生明显的褐色斑状腺点;花较大,长 8—9 毫米。

5. 吉隆女贞(云南植物研究)

Ligustrum gyirongense P. Y. Bai in Acta Bot. Yunnan. 1(1): 153, f. 3. 1979; M. C. Chang & B. M. Miao in Investigat. Stud. Nat. 6: 37. 1985; 西藏植物志 3: 885, 图 340, 8—10. 1986.



1. 倒卵叶女贞 *Ligustrum obovatilimbum* Miao, 果枝。2—3. 细女贞 *L. gracile* Rehd., 2. 花枝; 花。4—5. 小叶女贞 *L. quihoui* Carr., 4. 花枝; 5. 花。(陆锦文绘)