

1—4(—5.5) 厘米,宽 0.5—2(—3) 厘米,先端锐尖、钝或微凹,基部狭楔形至楔形,叶缘反卷,上面深绿色,下面淡绿色,常具腺点,两面无毛,稀沿中脉被微柔毛,中脉在上面凹入,下面凸起,侧脉 2—6 对,不明显,在上面微凹入,下面略凸起,近叶缘处网结不明显;叶柄长 0—5 毫米,无毛或被微柔毛。圆锥花序顶生,近圆柱形,长 4—15(—22) 厘米,宽 2—4 厘米,分枝处常有 1 对叶状苞片;小苞片卵形,具睫毛;花萼无毛,长 1.5—2 毫米,萼齿宽卵形或钝三角形;花冠长 4—5 毫米,花冠管长 2.5—3 毫米,裂片卵形或椭圆形,长 1.5—3 毫米,先端钝;雄蕊伸出裂片外,花丝与花冠裂片近等长或稍长。果倒卵形、宽椭圆形或近球形,长 5—9 毫米,径 4—7 毫米,呈紫黑色。花期 5—7 月,果期 8—11 月。

产于陕西南部、山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、四川、贵州西北部、云南、西藏察隅。生沟边、路旁或河边灌丛中,或山坡,海拔 100—2500 米。根据中国植物发表的。

叶入药,具清热解毒等功效,治烫伤、外伤;树皮入药治烫伤。

4. 斑叶女贞(植物分类学报) 图版 39:1—3

Ligustrum punctifolium M. C. Chang in Acta Phytotax. Sin. 23(1): 53. 1985; M. C. Chang & B. M. Miao in Investigat. Stud. Nat. 6: 36, pl. 3, f. 1—3. 1986. — *L. quihoui* auct. non Carr. 1869: Merr. & Chun in Sunyatsenia 1: 79. 1930, quoad Y. Tsiang 2933. — *L. retusum* auct. non Merr. 1935: Li in Journ. Arn. Arb. 24: 373. 1943, quoad W. T. Tsang 30664, sphalm. 30644.


灌木,高约 2 米。枝灰棕色,小枝灰黄色,均为圆柱形,被微柔毛。叶片革质,椭圆状长圆形、卵形或倒卵形,长 1—2 厘米,宽 0.8—1.2 厘米,先端钝或微凹,有时锐尖,基部楔形、宽楔形至近圆形,上面深绿色,无毛或沿中脉被微柔毛,散生斑状腺点,下面淡绿色,无毛,密被褐色斑状腺点,侧脉 2—3 对,不明显或在上部微凸起,近叶缘处不明显网结;叶柄长 0—2 毫米,被微柔毛。圆锥花序生小枝顶端,长约 5 厘米,宽约 2 厘米;花序轴被微柔毛;花梗长 0.5—1.3 毫米,无毛;花萼长约 1.5 毫米,无毛,截形或具波状齿;花冠长 8—9 毫米,花冠管长 4—5 毫米,裂片椭圆形,长 3.5—4 毫米,宽约 1.5 毫米,先端锐尖或略呈兜状;雄蕊几与花冠裂片等长或略短,花丝长 2—2.5 毫米,短于花冠裂片,花药长圆形,长约 2 毫米。果近球形,径约 4 毫米。花期 8 月,果期 10 月。

产于我国香港。生潮汐所致的平坦地。越南也有分布。模式标本采自香港。

与凹叶女贞 *L. retusum* Merr. 和小叶女贞 *L. quihoui* Carr. 的区别在于本种叶片下面密生明显的褐色斑状腺点;花较大,长 8—9 毫米。

5. 吉隆女贞(云南植物研究)

Ligustrum gyirongense P. Y. Bai in Acta Bot. Yunnan. 1(1): 153, f. 3. 1979; M. C. Chang & B. M. Miao in Investigat. Stud. Nat. 6: 37. 1985; 西藏植物志 3: 885, 图 340, 8—10. 1986.



1—3. 斑叶女贞 *Ligustrum punctifolium* M. C. Chang, 1. 花枝; 2. 花; 3. 叶背示腺点。4—5. 细梗女贞 *L. tenuipes* M. C. Chang, 4. 花枝; 5. 叶面示皱纹。6—7. 凹叶女贞 *L. retusum* Merr., 6. 花枝; 7. 花。
(陆锦文绘)