

米,先端截形或浅裂;花冠长4—5毫米,花冠管长1—3毫米,裂片长2—3毫米,与花冠管近等长或稍长,常反折;花丝长1—3毫米,稍短于裂片,花药长1—2毫米;花柱长1.5—3毫米。果倒卵形,长6—9毫米,径3—5毫米,两侧不对称,略弯,呈黑色。花期6—8月,果期8—10月。

产于陕西、甘肃、湖北、四川。生山谷林中、山顶灌丛中或河边沟旁,海拔300—2500米。模式标本采自湖北宜昌。

9. 凹叶女贞(海南植物志) 图版39:6—7

Ligustrum retusum Merr. in *Lingnan Sci. Journ.* **14**: 49. 1935; 海南植物志 **3**: 212, 图666. 1974; 中国高等植物图鉴 **3**: 362. 1974; M. C. Chang & B. M. Miao in *Investigat. Stud. Nat.* **6**: 40, pl. 3, f. 5—6. 1986.

直立灌木,高2—3米。枝和小枝圆柱形,浅灰褐色或浅灰黄色,具皮孔,初被微柔毛,后变无毛。叶片革质,倒卵状椭圆形、倒卵形至倒卵圆形,长1—4厘米,宽0.7—2厘米,先端钝而微凹,基部楔形或宽楔形,上面橄榄绿色,光亮,下面淡绿色,无腺点,两面无毛,侧脉3—4对,不明显或在两面微凸起,在近叶缘处弧形弯曲呈不明显网结;叶柄长1—4毫米,无毛或下面略被微柔毛。圆锥花序着生小枝顶端,长3—6厘米,宽2.5—4.5厘米,下部分枝长可达3厘米;花序轴被微柔毛,皮孔较密;花梗无或极短,被微柔毛;花萼无毛,长约1毫米,具浅齿或近截形;花冠长3—4毫米,花冠管长约1.5毫米,裂片长圆状椭圆形,长2—2.5毫米,先端锐尖或钝,反折;花丝长约3.5毫米,伸出裂片外,花药长圆形,长约1.2毫米。果近球形或椭圆形,长4—5毫米,径约3毫米。花期7—8月,果期12月至翌年4月。


产于海南儋县、昌江、乐东、崖县等地。生山坡灌丛、密林或疏林中,或海边。模式标本采自海南崖县。

10. 兴仁女贞(植物分类学报) 图版40:6

Ligustrum xingrenense D. J. Liu in *Acta Phytotax. Sin.* **26**(3): 243. 1988.

常绿灌木,高0.5—3米。枝圆柱形,当年生枝褐色或暗棕色,密被短柔毛,疏生皮孔,二年生枝褐色,被短柔毛,皮孔明显。叶片革质,卵形、卵圆形至卵状披针形或椭圆形,长1—5厘米,宽0.5—2.5厘米,先端锐尖、短渐尖或钝急尖,或微凹,基部楔形至近圆形,叶缘反卷,上面深绿色,有光泽,无毛,下面淡绿色,无毛,稀沿中脉略被微柔毛,侧脉2—6对,连同中脉在上面明显凹入,下面凸起不明显,在近叶缘处连接;叶柄长2—5毫米,被微柔毛。圆锥花序顶生,长2—6厘米;花序轴直至果期均密被短柔毛;花梗长0—2毫米,近无毛;花萼长约1.5毫米,截形或具三角状齿;花的其余部分未见。果近球形或椭圆形,长5—6毫米,径3—5毫米;果梗长约1毫米。果期9月至翌年3月。

产于贵州西部、云南东部。生灌丛或疏林中,山谷阴湿地或山顶,海拔400—1600米。模式标本采自贵州兴仁。



1—3. 斑叶女贞 *Ligustrum punctifolium* M. C. Chang, 1. 花枝; 2. 花; 3. 叶背示腺点。4—5. 细梗女贞 *L. tenuipes* M. C. Chang, 4. 花枝; 5. 叶面示皱纹。6—7. 凹叶女贞 *L. retusum* Merr., 6. 花枝; 7. 花。
(陆锦文绘)