

香;花萼被绒毛或无毛,裂片不明显,浅波状或几近截形;花冠黄色,近漏斗状,花冠管长0.8—1.2厘米,裂片4—5枚,宽卵形或近圆形、长圆形,长3—9毫米,宽3—4毫米。果球形或椭圆形,长1—1.6厘米,径0.5—1.6厘米,呈黑色或红黑色。花期3—7月,果期8月。

产于云南、四川西南部。生溪边或林中,海拔700—3300米。印度、尼泊尔及缅甸也有分布。模式标本采自云南保山县附近。

2. 矮探春(中国高等植物图鉴) 小黄馨(中国树木分类学), 小黄素馨、毛叶小黄素馨(植物分类学报), 矮素馨(植物研究)

Jasminum humile Linn. Sp. Pl. 7. 1753; C.B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 602. 1882; Ker in Bot. Reg. 5: t. 350. 1819; DC. Prodr. 8: 313. 1844; Lév. in Fedde, Rep. Sp. Nov. 13: 149. 1914; Rehd. in Sargent, Pl. Wils. 2: 615. 1916, p. p.; Lév. Cat. Pl. Yun-Nan 179. 1916; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1: 216. 1924; Kobuski in Journ. Arn. Arb. 13: 150. 1932, p. p.; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 1012. 1936; 陈嵘, 中国树木分类学 1035. 1937, excl. syn. *J. wallichianum* Lindl.; P. S. Green in Not. Bot. Gard. Edinb. 23: 362. 1961; 中国高等植物图鉴 365, 图 4683. 1974; Lauener & P. S. Green in Not. Bot. Gard. Edinb. 37(1): 127. 1978; Hara in Enum. Fl. Pl. Nepal 3: 80. 1982, p. p. excl. syn.; Miao in Bull. Bot. Res. 4(1): 97. 1984; 西藏植物志 3: 888, 图 341, 1—3. 1986; 云南植物志 4: 649. 1986, p. p. — *J. mairei* Lév. in Fedde, Rep. Sp. Nov. 13: 337. 1914. — *J. mairei* var. *siderophyllum* Lév. Cat. Pl. Yun-Nan 179. 1916. — *J. humile* var. *siderophyllum* (Lév.) Kobuski in Journ. Arn. Arb. 20: 406. 1939; Rehd. Man. Cult. Trees & Shrubs ed. 2, 793. 1940; Chia in Acta Phytotax. Sin. 2: 27. 1952; 中国高等植物图鉴 3: 365. 1974; 西藏植物志 3: 888. 1986.

2a. 矮探春(原变种)

var. *humile*

灌木或小乔木,有时攀援,高0.5—3米。小枝无毛或疏被短柔毛,棱明显。叶互生,复叶,有小叶3—7枚,通常5枚,小枝基部常具单叶;叶柄长0.5—2厘米,具沟,无毛或被短柔毛;叶片和小叶片革质或薄革质,无毛或上面疏被短刚毛,下面脉上被短柔毛;小叶片卵形至卵状披针形,或椭圆状披针形至披针形,稀为倒卵形,先端锐尖至尾尖,基部圆形或楔形,全缘,叶缘反卷,有时多少具紧贴的刺状睫毛,侧脉2—4对,有时不明显;顶生小叶片长1—6厘米,宽0.4—2厘米,侧生小叶片长0.5—4.5厘米,宽0.3—2厘米。伞状、伞房状或圆锥状聚伞花序顶生,有花1—10(—15)朵;稀有苞片,苞片线形,通常长2—4毫米;花梗长0.5—3厘米,无毛或被微柔毛;花多少芳香;花萼无毛或被微柔毛,裂片三角形,较萼管短;花冠黄色,近漏斗状,花冠管长0.8—1.6厘米,裂片圆形或卵形,长3—7毫米,先端圆或稍尖。果椭圆形或球形,长0.6—1.1厘米,径4—10毫米,成熟时呈紫黑色。花期