

云南植物志 4: 656. 1986. — *J. urophyllum* var. *henryi* Rehd. in Sargent, Pl. Wils. 2: 613. 1916; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1: 217. 1924. — *J. taiwanianum* Masamune in Journ. Soc. Trop. Agric. 2: 152. 1930; Chia in Acta Phytotax. Sin. 2: 32. 1952.

攀援灌木, 高 2—3 米。小枝纤细, 具条纹, 无毛至密被柔毛。叶对生, 三出复叶; 叶柄长 1—4 厘米, 具沟; 小叶片革质, 宽卵形、长椭圆形、卵形, 狭卵形至披针形, 先端渐尖至尾状渐尖, 基部圆形或微心形, 叶缘反卷, 两面光滑或下面被贴伏短柔毛, 基出脉 3 条, 直达小叶片顶端; 顶生小叶片长 (3—) 6—12.5 厘米, 宽 1.3—4 厘米, 小叶柄长 0.8—2.5 厘米, 侧生小叶片较小, 长 2—7.5 厘米, 宽 0.8—2.5 厘米, 小叶柄长 0.5—5 毫米。伞房花序或伞房状聚伞花序顶生或腋生, 有花 3—10 朵, 疏被至密被柔毛; 苞片线形, 长 0.5—5 毫米; 花梗长 0.5—4 厘米, 无毛, 稀密被短柔毛; 花萼无毛至密被短柔毛, 萼齿小, 钝三角形或尖三角形, 长不超过 2 毫米; 花冠白色, 花冠管长 1.2—1.8 厘米, 裂片 5—6 枚, 卵形, 长 5—6 (—10) 毫米, 宽 3—4 毫米, 先端圆钝或锐尖。果椭圆形或近球形, 长 0.8—1.2 厘米, 径 0.5—1.2 厘米, 成熟时呈紫黑色。花期 6—10 月, 果期 8—10 月。

产于台湾、湖北、湖南、广西西部、四川、贵州、云南绥江。生山谷、林中, 海拔 900—2 200 米。模式标本采自四川峨眉山。

7. 短萼素馨 (植物分类学报)

Jasminum brevidentatum Chia in Acta Phytotax. Sin. 2: 40, f. 3. 1952; Miao in Bull. Bot. Res. 4(1): 99. 1984. — *J. brevidentatum* var. *ferrugineum* Chia, l. c. 2: 42, f. 4. 1952.

攀援灌木, 高 1—2.5 米。小枝具棱, 无毛。叶对生, 单叶, 叶片革质, 长卵形或卵状披针形, 长 5.5—17 厘米, 宽 2—5 厘米, 先端渐尖或锐尖, 基部圆形或宽楔形, 稀微心形, 叶缘反卷, 两面无毛, 下面具不明显黄色腺点, 后脱落成黑色凹点, 基出脉 3 条, 直达顶端; 叶柄长 1—3.5 厘米, 具沟, 无毛。伞房状聚伞花序顶生或腋生, 有花 3—13 朵; 花序梗长 2—6 厘米; 苞片锥形, 长 2—7 毫米; 花梗细长, 长 0.5—2.5 厘米, 向上渐增粗, 无毛; 花萼钟状, 无毛, 裂片 4—5 枚, 微小, 尖三角形, 长不超过 1 毫米; 花冠白色, 漏斗状, 花冠管长 1—1.5 厘米, 裂片 5 枚, 卵形, 长 4—7 毫米, 宽 2—4 毫米。果椭圆形或球形, 长 7—10 毫米, 径 5—10 毫米, 呈黑色。花期 7—9 月, 果期 9—11 月。

产于福建、湖南、广西。生海拔 1 200 米以下的山地、丛林。模式标本采自广西桂林。

8. 华南素馨 (植物分类学报) 华南茉莉 (中国高等植物图鉴)

Jasminum cathayense Chun ex Chia in Acta Phytotax. Sin. 2: 52, f. 7. 1952; 中国高等植物图鉴 3: 368. 1974; Miao in Bull. Bot. Res. 4(1): 91. 1984.

缠绕藤本, 高 1—3 米。小枝圆柱形, 具不明显的棱角, 无毛。叶对生, 单叶, 叶片革质, 长卵形、披针形或狭椭圆形, 长 6—15.5 厘米, 宽 2—4.7 厘米, 先端渐尖, 基部楔形或圆