

状,萼齿5枚,尖三角形,长0.5—1毫米;花冠粉红色、紫色或白色,近漏斗状,花冠管长1.1—2厘米,基部直径1—3毫米,裂片4—5枚,长圆形或卵形,长0.6—1.1厘米,宽3—10毫米,先端截形、钝圆或具短尖头。果球形,径0.6—1.2厘米,呈黑色。花期12月至翌年5月,果期5—12月。

产于广西西南部、云南。生峡谷、林中或灌丛中,海拔1200—3100米。模式标本采自云南。

植株的根皮外用民间治疥疮。

13. 倒吊钟叶素馨(植物分类学报) 吊钟叶素馨(云南植物志) 图版50:3

Jasminum fuchsiaefolium Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France **80**:74. 1933; Chia in Acta Phytotax. Sin. **2**:58. 1952; Miao in Bull. Bot. Res. **4**(1): 92. 1984; 云南植物志 **4**: 666,图版186, 1—2. 1986.

攀援灌木。小枝扭曲,四棱形,中空,光滑无毛。叶对生,单叶,叶片纸质或膜质,长卵形,狭椭圆形至卵状披针形,长5—17.5厘米,宽1.3—4.5(—6)厘米,先端渐尖或锐尖,基部圆形、截形或楔形,侧脉5—9对,在近叶缘处呈弧形汇合;叶柄长4—10毫米,具狭翼。花单生或呈稀疏开展的总状聚伞花序,有花3—6朵,3朵时花序呈伞状聚伞花序;花序梗长1.5—5厘米,无毛;花梗细长,长1—4厘米,向上渐增粗;小苞片线形,长1—6毫米;花萼钟状,光滑无毛,裂片5枚,锥形或三角形,长1—2毫米;花冠白色,高脚碟状,花冠管长1—1.4厘米,径1—1.5毫米,向上不增大,裂片5—6枚,长圆形至披针形,长7—9毫米,先端锐尖至渐尖。果球形或椭圆形,两心皮基部叉开,径6—10毫米,成熟时呈蓝紫色。花期6—9月,果期10月至翌年1月。

产于广西西部、贵州、云南。生山坡、灌丛,海拔1000—2200米。模式标本采自贵州姚家寨。

14. 素方花(罗尔氏安南植物名录) 耶悉茗(南方草木状)

Jasminum officinale Linn. Sp. Pl. 7. 1753; Curtis in Curtis's Bot. Mag. **1**: t. 31. 1787; DC. Prodr. **8**: 313. 1844; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **3**: 603. 1882; Rehd. in Sargent, Pl. Wils. **2**:613. 1916 et Man. Cult. Trees & Shrubs ed. 2, 792. 1940; Lév. Cat. Pl. Yun-Nan 179. 1916; Chung in Mem. Sci. Soc. China **1**: 216. 1924; Kobuski in Journ. Arn. Arb. **13**:160. 1932, **40**:387. 1959; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:1013. 1936; 陈嵘,中国树木分类学 1033.1937; Chia in Acta Phytotax. Sin. **2**: 36. 1952; 中国高等植物图鉴 **3**: 367, 图4688. 1974; Hara in Enum. Fl. Pl. Nepal **3**: 81. 1982; Miao in Bull. Bot. Res. **4**(1): 92. 1984; 云南植物志 **4**: 657, 图版184, 3—4. 1986, p. p. excl. syn. J. affine Lindl.; 西藏植物志 **3**: 890, 图342, 4—8. 1986.

14a. 素方花(原变种) 图版51: 1—3

var. *officinale*