

in Journ. Arn. Arb. **13**: 167. 1932, **40**: 387. 1959; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine **3**: 1042. 1933; Chia in Acta Phytotax. Sin. **2**: 44. 1952; 海南植物志 **3**: 205. 1974; Miao in Bull. Bot. Res. **4**(1): 103. 1984; 云南植物志 **4**: 662. 1986. — *J. inornatum* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 78. 1889; Dunn & Tutchter in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. **10**: 165. 1912; Lévl. in Fedde, Rep. Sp. Nov. **13**: 149. 1914; Chung in Mem. Sci. Soc. China **1**: 216. 1924.

攀援灌木，高达 5 米。小枝纤细，圆柱形，无毛或微被短柔毛。叶对生，单叶，叶片薄革质或革质，窄卵形、宽卵形或椭圆形至卵状披针形，长 3.5—9 厘米，宽 1.5—4.5 厘米，先端锐尖，短渐尖至渐尖，基部宽楔形、圆形或截形，两面除下面脉腋间具黄色簇毛外，其余无毛，侧脉 3—4 对，在两面稍明显；叶柄长 0.5—1.2 厘米，中部具关节，被短柔毛。聚伞花序顶生或腋生，有花 2—5 朵，有时仅 1 朵；花序梗纤细，长 0.6—2.5 厘米；苞片微小，线形，长约 1 毫米；花梗短，长 1—5 毫米，常呈棍棒状；花芳香，小；花萼坛状，长约 1 毫米，裂片 4—5 枚，圆钝或几近截形；花冠白色，花冠管长 1—1.6 厘米，裂片 5—6 枚，卵形，长 4—5 毫米，宽 2—2.5 毫米。果椭圆形，长 0.9—1.2 厘米，径 4—6 毫米，呈黑色。花期 5—10 月，果期 12 月至翌年 2 月。

产于广东、海南、广西、云南勐腊。生低海拔的山谷、疏林或灌丛中。越南也有分布。模式标本采自海南海口。

28. 樟叶素馨(植物分类学报)

Jasminum cinnamomifolium Kobuski in Journ. Arn. Arb. **20**: 64. 1939, **46**: 387. 1959; Merr. & Chun in Sunyatsenia **5**: 167. 1940; Chia in Acta Phytotax. Sin. **2**: 53. 1952; 海南植物志 **3**: 207. 1974; Miao in Bull. Bot. Res. **4**(1): 94. 1984; 云南植物志 **4**: 663. 1986.

攀援灌木，高 1—4 米，全株无毛。小枝圆柱形或具沟纹，径 1—2 毫米。叶对生，单叶，叶片纸质或薄革质，椭圆形或狭椭圆形，稀披针形，长 5—10.5 厘米，宽 1.5—4.5 厘米，先端锐尖至渐尖，基部楔形或圆形，叶缘反卷，基出脉 5 条，外侧 1 对不明显，向上延伸直达上部，并与横脉相连接；叶柄长 4—10 毫米，扭转，有关节。花单生，或呈伞状聚伞花序，顶生或腋生，有花 1—5 朵；花序无梗或梗长 0.2—2 厘米；苞片线形，长 2—4 毫米；花梗细长，长 1.4—2.5 厘米，向上渐增粗；萼管长 2—3 毫米，裂片 5 枚，尖三角形，长 1—2 毫米；花冠白色，高脚碟状，花冠管长 0.9—1.3 厘米，径 1—2 毫米，裂片 9—11 枚，披针形，长 1.1—2 厘米，宽 1.5—3 毫米，先端渐尖。果近球形或椭圆形，长 1—1.5 厘米，径 0.8—1.5 厘米，呈黑色。花期 3—9 月，果期 5—11 月。

产于海南、云南镇康。生海拔 1400 米以下的林中、沙地。模式标本采自海南感恩。

29. 心叶素馨(海南植物志) 心叶西氏素馨(植物分类学报)，心叶茉莉(中国高等植物图鉴)