

1—5朵,通常花单生于叶腋;花序梗长0.2—1.2(—1.8)厘米或缺;苞片线形,长0.1—1.3厘米;花梗长1—10毫米,无毛或微被短柔毛;花芳香;花萼常呈白色,无毛或微被短柔毛,裂片7—8枚,线形,长0.5—1.7厘米,果时常增大;花冠白色,高脚碟状,花冠管长1.3—2.6厘米,径1—2毫米,裂片8—10枚,披针形,长0.8—2.5厘米,宽2—5毫米,先端锐尖至渐尖。果球形或长圆形,长0.7—2厘米,径0.5—1.3厘米,成熟时由红变黑。花期3—7月,果期4—10月。

产于台湾、广东、海南、广西、贵州、云南、西藏。生海拔2000米以下的山坡、沙地、灌丛及混交林中。印度、不丹、缅甸、越南、老挝和柬埔寨等也有分布。模式标本采自越南。

34. 银花素馨 (植物分类学报)

Jasminum nintooïdes Rehd. in Sargent, Pl. Wils. 2:615. 1916; Lévl. Cat. Pl. Yun-Nan 179. 1916; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1:216. 1924; Kobuski in Journ. Arn. Arb. 13:171. 1932, 40:388. 1959; Chia in Acta Phytotax. Sin. 2:45. 1952; Miao in Bull. Bot. Res. 4(1):95. 1984; 云南植物志 4: 666, 图版 187, 4—6. 1986.

攀援灌木,高0.5米。小枝圆柱形,径1—2毫米,无毛或被锈色长柔毛,当年生枝较细,径0.8毫米,密被锈色长柔毛。叶对生,单叶,叶片革质,卵形或宽卵形,长1—3.5厘米,宽1—2.5厘米,先端钝或锐尖,基部截形或圆形,稀微心形,叶缘反卷,上面光滑或散生长柔毛,下面较密至密被锈色长柔毛,侧脉3—4对,在两面均不明显,通常最下面1对侧脉较明显而成基出脉状;叶柄短,密被锈色长柔毛,长1—6毫米。花单生于叶腋或2—4朵集生于小枝顶端;花梗长2—4毫米,被锈色长柔毛;小苞片线形,长约2毫米;花萼密被锈色长柔毛,裂片线形,长2—3毫米;花冠白色,花管细长,长约2厘米,裂片5—6枚,披针形,长8—10毫米,宽2—4毫米,先端急尖至渐尖。果近球形或椭圆形,长0.7—1.3厘米,径0.6—1.2厘米,呈紫黑色。花期5—9月,果期10月至翌年1月。

产于云南东南部。生岩石坡或密林中,海拔1300—1600米,模式标本采自云南蒙自。

35. 毛萼素馨(植物分类学报)

Jasminum pilosicalyx Kobuski in Journ. Arn. Arb. 20: 68. 1939, 40:388. 1959; Merr. & Chun in Sunyatsenia 5: 167. 1940; Chia in Acta Phytotax. Sin. 2:45. 1952; 海南植物志 3: 208. 1974; Miao in Bull. Bot. Res. 4(1): 95. 1984.

木质藤本。小枝圆柱形,径1.5—2毫米,密被锈色柔毛。叶对生,单叶,叶片纸质,卵状椭圆形或长卵形,长7—10厘米,宽2.5—7厘米,先端钝而突渐尖,基部微心形或近圆形,叶缘具睫毛,两面疏被黄色长柔毛,下面较密,侧脉5对,下面被较密长柔毛;叶柄长3—10毫米,疏被锈色长柔毛。聚伞花序顶生,有花3朵,常单花顶生或腋生;花序梗及花梗均密被黄色长柔毛,花梗长2—5毫米;苞片线形,密被长柔毛,长2—3毫米;花萼密被长柔毛,萼管长1.5毫米,裂片5枚,锥形,长3—6毫米;花冠白色。果未见。花期7月。

产于海南。生林中,海拔约400米左右。模式标本采自海南保亭。