

Jasminum ligustrioides Chia in Acta Phytotax. Sin. 2:48, f. 6. 1952; Miao in Bull. Bot. Res. 4(1):107. 1984.

攀援灌木，高达3米。小枝圆柱形，径约1毫米，被短柔毛。叶对生，单叶，叶片革质，卵形或宽卵形，长2.5—6.5厘米，宽1.5—4.5厘米，先端钝、锐尖或渐尖，具小凸尖，基部宽楔形或圆形，有时几近截形，两面无毛或疏被微柔毛，侧脉3—4对；叶柄长3—10毫米，被短柔毛，中部具关节。伞房状聚伞花序顶生，有花2—13朵，稍密集，稀花单生；花序梗长0.2—1.2厘米；花序基部常具小叶状苞片，其余苞片线形，长2—9毫米；花梗短，长1—6毫米；花萼外面疏被短柔毛或近无毛，内面被长柔毛，裂片锥形，长3—8毫米，具睫毛；花冠白色，花冠管长1.5—3厘米，裂片6—8枚，披针形，长8—10毫米，宽2—3.5毫米，先端锐尖；花柱异长。果长卵形，长8—10毫米，径约5毫米。花期10—12月，果期至翌年2—4月。

产于海南。生低海拔的疏林、灌丛及沙地。模式标本采自海南崖县。

41. 长管素馨(植物研究)

Jasminum longitubum Chia ex Miao in Bull. Bot. Res. 4(1):107. 1984.

木质藤本。小枝圆柱形，径约0.8毫米，被短柔毛。叶对生，单叶，叶片薄革质或革质，卵形或长圆形，长3.5—8.5厘米，宽1.5—4厘米，先端锐尖至渐尖，具短尖头，稀圆钝，基部微心形或圆形，上面深绿色，光亮，下面淡绿色，侧脉3—5对，在上面微凸起，下面明显凸起，除脉腋间具黄色簇毛外，其余无毛；叶柄长2—7毫米，密被短柔毛，中部具关节。单花或聚伞花序有花2—3朵，顶生；花序基部常具叶状苞片，苞片披针形，长1.5—2.2厘米，宽4—5毫米，其余苞片锥形，长约1.5毫米；花梗长约2毫米或更短，微被短柔毛；花萼被短柔毛，萼管筒状，长约3.5毫米，裂片线形，长4—9毫米；花冠白色，花冠管长约3厘米，径约1毫米，裂片6—7枚，披针形，长1—1.4厘米，宽3—5毫米，先端锐尖或钝。果未见。花期8月。

产于广西龙州。模式标本采自该县。

42. 白萼素馨(植物分类学报) 白萼茉莉(中国高等植物图鉴)

Jasminum albicalyx Kobuski in Journ. Arn. Arb. 20:64. 1939. 40:287. 1959; Chia in Acta Phytotax. Sin. 2: 46. 1952; 中国高等植物图鉴 3: 370. 1974; Miao in Bull. Bot. Res. 4(1): 96. 1984.

攀援灌木，高1—3米。小枝圆柱形，常灰白色，幼枝被短柔毛。叶对生或近对生，单叶，叶片纸质，卵形、长卵形或椭圆形，长3.5—10.5厘米，宽1.5—4.5厘米，先端锐尖至渐尖，基部圆形、钝或狭微心形，侧脉3—5对，在两面明显，脉腋间具黄色簇毛，老时脱落，脉上常被短柔毛；叶柄长2—5毫米，被短柔毛，具关节。聚伞花序密集，顶生或腋生，有花2—5朵；花序梗长0.5—4厘米，被短柔毛；苞片线形，长1—10毫米；花近无梗或具短梗，梗长不超过3毫米，径1毫米；花萼白色，干时黄白色，被短柔毛或无毛，萼管长2—3毫米，裂片5—8枚，线形，长0.4—1.2厘米；花冠白色，花冠管长1.8—2.2厘米，裂片5—6枚，卵形或披针