

Jasminum ligustrioides Chia in Acta Phytotax. Sin. 2:48, f. 6. 1952; Miao in Bull. Bot. Res. 4(1):107. 1984.

攀援灌木，高达3米。小枝圆柱形，径约1毫米，被短柔毛。叶对生，单叶，叶片革质，卵形或宽卵形，长2.5—6.5厘米，宽1.5—4.5厘米，先端钝、锐尖或渐尖，具小凸尖，基部宽楔形或圆形，有时几近截形，两面无毛或疏被微柔毛，侧脉3—4对；叶柄长3—10毫米，被短柔毛，中部具关节。伞房状聚伞花序顶生，有花2—13朵，稍密集，稀花单生；花序梗长0.2—1.2厘米；花序基部常具小叶状苞片，其余苞片线形，长2—9毫米；花梗短，长1—6毫米；花萼外面疏被短柔毛或近无毛，内面被长柔毛，裂片锥形，长3—8毫米，具睫毛；花冠白色，花冠管长1.5—3厘米，裂片6—8枚，披针形，长8—10毫米，宽2—3.5毫米，先端锐尖；花柱异长。果长卵形，长8—10毫米，径约5毫米。花期10—12月，果期至翌年2—4月。

产于海南。生低海拔的疏林、灌丛及沙地。模式标本采自海南崖县。

41. 长管素馨(植物研究)

Jasminum longitubum Chia ex Miao in Bull. Bot. Res. 4(1):107. 1984.

木质藤本。小枝圆柱形，径约0.8毫米，被短柔毛。叶对生，单叶，叶片薄革质或革质，卵形或长圆形，长3.5—8.5厘米，宽1.5—4厘米，先端锐尖至渐尖，具短尖头，稀圆钝，基部微心形或圆形，上面深绿色，光亮，下面淡绿色，侧脉3—5对，在上面微凸起，下面明显凸起，除脉腋间具黄色簇毛外，其余无毛；叶柄长2—7毫米，密被短柔毛，中部具关节。单花或聚伞花序有花2—3朵，顶生；花序基部常具叶状苞片，苞片披针形，长1.5—2.2厘米，宽4—5毫米，其余苞片锥形，长约1.5毫米；花梗长约2毫米或更短，微被短柔毛；花萼被短柔毛，萼管筒状，长约3.5毫米，裂片线形，长4—9毫米；花冠白色，花冠管长约3厘米，径约1毫米，裂片6—7枚，披针形，长1—1.4厘米，宽3—5毫米，先端锐尖或钝。果未见。花期8月。

产于广西龙州。模式标本采自该县。

42. 白萼素馨(植物分类学报) 白萼茉莉(中国高等植物图鉴)

Jasminum albicalyx Kobuski in Journ. Arn. Arb. 20:64. 1939. 40:287. 1959; Chia in Acta Phytotax. Sin. 2: 46. 1952; 中国高等植物图鉴 3: 370. 1974; Miao in Bull. Bot. Res. 4(1): 96. 1984.

攀援灌木，高1—3米。小枝圆柱形，常灰白色，幼枝被短柔毛。叶对生或近对生，单叶，叶片纸质，卵形、长卵形或椭圆形，长3.5—10.5厘米，宽1.5—4.5厘米，先端锐尖至渐尖，基部圆形、钝或狭微心形，侧脉3—5对，在两面明显，脉腋间具黄色簇毛，老时脱落，脉上常被短柔毛；叶柄长2—5毫米，被短柔毛，具关节。聚伞花序密集，顶生或腋生，有花2—5朵；花序梗长0.5—4厘米，被短柔毛；苞片线形，长1—10毫米；花近无梗或具短梗，梗长不超过3毫米，径1毫米；花萼白色，干时黄白色，被短柔毛或无毛，萼管长2—3毫米，裂片5—8枚，线形，长0.4—1.2厘米；花冠白色，花冠管长1.8—2.2厘米，裂片5—6枚，卵形或披针

形,长5—10毫米,宽2—4毫米,先端渐尖。果长圆形,长0.6—1.5厘米,径4—7毫米。花期10—11月,果期3月。

产于广西。生低海拔的山地、密林中。模式标本采自广西容县。

植株药用治跌打损伤。

43. 白皮素馨(植物分类学报) 白皮藤(海南)

Jasminum rehderianum Kobuski in Sunyatsenia 3:110. 1936 et in Journ. Arn. Arb. 20:68. 1939, 40:387. 1959; Merr. & Chun in Sunyatsenia 5:167. 1940; Chia in Acta Phytotax. Sin. 2: 47. 1952; 海南植物志 3: 206. 1974; Miao in Bull. Bot. Res. 4(1):96. 1984.

攀援灌木,高达3米。小枝圆柱形,灰白色,当年生枝疏被长柔毛。叶对生,单叶,叶片纸质或薄革质,椭圆形、卵形或狭卵形,稀近圆形,长2—5.5厘米,宽1.5—2.7厘米,先端锐尖或钝而具短尖头,基部圆形或楔形,上面光亮,干时绿色,除中脉有时被毛外,其余无毛,下面沿中脉被短柔毛,脉腋间具黄褐色簇毛,侧脉2—4对,在两面微凸起;叶柄长2—6毫米,扭转,被长柔毛,中部具关节。花单生于枝端或叶腋;花序梗缺或长达6毫米;苞片线形,长1—2毫米;花梗长0.8—2厘米,疏被长柔毛;花萼外面无毛,内面近边缘处被长柔毛,裂片6或7枚,线形,长5—8毫米,内面被长柔毛;花冠白色或黄白色,高脚碟状,花冠管长1.5—2厘米,裂片5枚,披针形,长1.3—2厘米,宽3—6毫米,先端渐尖或锐尖。果通常由两心皮发育而成双生,成熟时近球形或椭圆形,长0.7—1.2厘米,径5—7毫米,呈黑色。花期8—9月,果期9月至翌年3月。

产于海南。生低海拔的山坡、丛林、旷野。模式标本采自海南崖县。

44. 绒毛素馨(云南植物研究)

Jasminum hongshuihoense Jien, nom. nov. — *J. tomentosum* S. Y. Bao ex P. Y. Bai in Acta Bot. Yunnan. 5: 67, f. 3. 1983; 云南植物志 4: 668, 图版188, 4. 1986, non Knobl. 1893.

木质藤本。小枝圆柱形,被短柔毛。叶对生,单叶,叶片纸质,椭圆形、狭椭圆形或披针形,稀倒卵形,长4.5—19厘米,宽2—7厘米,先端钝、锐尖至渐尖,稀圆形,基部楔形、圆钝或微心形,上面除中脉散生短柔毛外,其余无毛,下面被短柔毛,老叶有时毛脱落,侧脉4—10对,脉腋间常具黄色簇毛;叶柄长5—10毫米,常扭转,被短柔毛。伞状聚伞花序顶生或腋生,有花1—5朵;花序梗长0.3—2厘米,被短柔毛;苞片线形,长2—5毫米;花梗长0.8—1.8厘米,向上渐增粗,无毛或被短柔毛;花萼被短柔毛,果时渐脱落,萼管长约2毫米,裂片5—8枚,线形,长4—5毫米;花冠白色,高脚碟状,花冠管长约1.4厘米,径约1毫米,裂片6—8枚,披针形,长1—1.2厘米,宽约2毫米。果近球形,长约1.7厘米,径约1.5厘米,呈蓝黑色。花期4月,果期10月。

产于广西、贵州、云南。生山坡沟边或林缘,海拔300—1000米。模式标本采自云南