

2种,分布于印度、泰国和印度尼西亚。我国栽培1种。

1. 夜花(中国种子植物科属辞典) 图版 57: 5—6

Nyctanthes arbor-tristis Linn. Sp. Pl. 6. 1753; Willd. Sp. Pl. 1: 35. 1797; Ait. Hort. Kew. ed. 2, 1:15. 1810; Ker in Bot. Reg. 5:t. 399. 1819; Roxb. Fl. Ind. 1:85. 1820; DC Prodr. 8:314. 1844; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3:603. 1882; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 3: 1059, f. 120. 1933; 中国高等植物图鉴3: 371, 图 4695. 1974. — *Parilium arbor-tristis* Gaertn. Fruct. 1: 234, t. 51, f. 1. 1788. — *Scabrita scabra* Linn. Syst. Nat. ed. 12, 2:115. 1767; Vahl Symb. Bot. 2: 28. 1791. — *S. triflora* Linn. Mant. 1:37. 1767.

小乔木,高可达10米。小枝黑灰色、褐色或淡褐色,四棱形,被糙硬毛。叶片革质,卵形或长卵形,长3—16厘米,宽2—7.5厘米,先端锐尖至渐尖,基部圆形或微心形,枝上部叶为楔形,全缘或具几枚不整齐的齿,叶缘反卷,两面被糙硬毛,侧脉3—5对,在上面平或微凸起,下面明显凸起;叶柄长0.4—2厘米,上面具沟,被短柔毛。头状花序有花3—5朵,通常再排列成聚伞花序,顶生或腋生;苞片卵形、倒卵形或近圆形;无花梗;花芳香,小;花萼管状,外被柔毛,长5—9毫米,先端5浅裂或几近截形、花冠黄色,高脚碟状,花冠管长7—10毫米,裂片4—8枚,长5—7毫米,宽3—5毫米,先端2裂;雄蕊几无花丝,花药内藏;花柱与花冠管近等长,柱头头状,常2裂。果压扁,倒心形或椭圆形,有时近圆形,长1.5—2厘米,宽1.2—1.9厘米,先端具短尖头,中间具一条纵肋,黑色,成熟时开裂成2片,每室具种子1枚;种子宽卵形,长约9毫米,宽约7毫米。花期11月至翌年2月,果期2月至7月。

原产印度,泰国。我国云南西双版纳寺庙前有栽培,东南亚各国也有栽培。

本种入夜开花,晨即闭合,花颇美丽,故栽培供观赏;花的浅黄色液汁可染布。

5. 胶核木族——Trib. MYXOPYRAE L. Johnson

L. Johnson in Contr. N. S. W. Nat. Herb. 2(6):397. 1957.


叶对生,单叶。花两性,花冠呈壶状,4裂。浆果单生。

仅1属,我国有分布。

12. 胶核木属*——*Myxopyrum* Bl.

Bl. Bijdr. 683. 1826 et Mus. Bot. Lugd. -Bat. 1:320. 1850.

* 胶核木属(中国种子植物科属辞典)



1. 元江素馨 *Jasminum yuanjiangense* P. Y. Bai, 果枝。2—4. 梔花素馨 *J. lang* Gagnep., 2. 花枝；
3. 花冠展开；4. 果。5—6. 夜花 *Nyctanthes arbor-tristis* Linn., 5. 花枝；6. 果。(陆锦文绘)