

1—3. 1983.

木质藤本。枝条圆柱形,灰棕色,有明显的托叶痕;除花萼裂片边缘被疏睫毛外,全株均无毛。叶片线状披针形,长6—12厘米,宽1—1.5厘米,顶端长渐尖,基部楔形;中脉两面均凸起,侧脉每边8—9条,网脉不明显;叶柄长3—5毫米,腹部有槽沟。花单生于叶腋内,5数;花梗中部以下有2枚钻形的苞片;苞片长5毫米;花萼裂片三角形;花冠白色,花冠裂片披针形,长6—7毫米,稍肥厚;雄蕊着生于花冠管内壁基部,花丝短,花药分离,长圆状披针形,顶端钝,基部2裂;子房卵形或圆球形,花柱圆柱状,长4—5毫米,柱头头状。浆果圆球形,直径约1厘米。花期7月,果期10月。

产于四川越西和云南镇雄等地。生海拔1900—2000米的石灰岩山地阔叶林中。模式标本采自云南镇雄。

4. 柳叶蓬菜葛(云南植物志) 披针叶蓬菜葛(中国高等植物图鉴),黑斤藤(贵州),窄叶血光藤(四川)

Gardneria lanceolata Rehd. & Wilson in Sarg. Pl. Wilson 1:563. 1913; Chun in Sunyatsenia 4:259 1940; Leenhouts in Bull. Jard. Bot. Etat. Brux. 32:435. 1962; 中国高等植物图鉴 3: 376, 图 4705. 1974; 云南植物志 3: 445. 1983.

攀援灌木。枝条圆柱形,棕褐色,有明显叶痕;除花冠裂片内面被柔毛外,全株均无毛。叶片坚纸质至近革质,披针形至长圆状披针形,长5—15厘米,宽1—4厘米,顶端渐尖,基部圆或楔形,上面深绿色,下面苍绿色;侧脉每边5—9条,网脉不明显;叶柄长5—10毫米。花5数,白色,单生于叶腋内;花梗长1.5—2厘米,中部有1—2枚钻形的小苞片,基部有2枚钻状苞片,苞片长达1厘米;花萼杯状,裂片圆形,长和宽约1.5毫米;花冠长约1厘米,花冠管长约2毫米,裂片披针形,长约8毫米;雄蕊着生于花冠管的基部,花丝极短,花药合生,卵状披针形,长约7毫米,2室;子房圆球形,直径约1.2毫米,花柱圆柱状,长约7毫米,柱头浅2裂,每室有胚珠1颗。浆果圆球状,直径达1厘米,成熟后桔红色,顶端常宿存有花柱。花期6—8月,果期9—12月。

产于江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州和云南等省区。生海拔1000—3000米的山坡灌木丛中或山地疏林下。模式标本采自四川。

组 2. 蓬菜葛组——Sect. *Gardneria*

花萼裂片、花冠裂片和雄蕊均为4。

本组模式种: 卵叶蓬菜葛 *Gardneria ovata* Wall.

约2种,分布于印度、斯里兰卡、泰国、马来西亚、印度尼西亚和中国。我国均产。

5. 卵叶蓬菜葛(云南植物志) 图版 64:1—8

Gardneria ovata Wall. in Roxb. Fl. Ind. 1: 400. 1820; G. Don, Gen. Hist. Dichlam. pl. 4:67. 1837; DC. Prodr. 9: 20. 1845; Benth. in Journ. Linn. Soc. Bot.