

卵状椭圆形,长1.8—2毫米,花柱极长,线形,长5.5—8毫米,柱头小,头状,2裂。蒴果近圆球形;种子多数。

产西藏、云南、四川。生于林下,海拔1750—2350米。模式标本采自锡金。

3. 小黄管属——*Sebaea* Soland. ex R. Br.

Soland. ex R. Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 451. 1810.

一年生小草本。叶对生,小,鳞片形至披针形。花5数,顶生呈聚伞花序;花萼开展,深裂至近基部,萼筒甚短,裂片背面的中脉呈脊状突起;花冠深裂,冠筒与裂片近等长;雄蕊着生于花冠裂片间弯缺处,花丝短,线形,花药椭圆形,纵裂;子房二室,花柱极长,线形,柱头2裂,裂片圆形。蒴果矩圆形或近圆球形,成熟时2瓣裂;种子极小,多数,表面具蜂窝状网隙。

属模式:卵叶小黄管 *S. ovata* (Labill.) R. Br.

约100种,分布于非洲温带、马达加斯加、斯里兰卡、印度、尼泊尔、中国和大洋洲。我国仅有1种。

1. 小黄管(中国高等植物图鉴) 图版 1: 11—15

Sebaea microphylla (Edgew.) Knobl. in Bot. Centralbl. **60**(30): 324. 1894; 吴征镒、李锡文, 云南热带亚热带植物区系研究报告 **1**: 33. 1964; 中国高等植物图鉴 **3**: 383, 图4719, 1974; Hara, Chatter et Williams, Enum. Fl. Pl. Nepal **3**: 95. 1982. — *Cicendia microphylla* Edgew. in Trans. Linn. Soc. **20**: 83. 1846. — *Sebaea khasiana* C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. **14**: 428. 1875 et in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**: 99. 1883; A. S. Rao et P. K. Hajra in Bull. Bot. Surv. Ind. **15**(1—2): 145. f. 1—5. 1973.

一年生小草本,高5—10厘米,全株光滑。茎直立,绿色,近圆形,单一,不分枝。叶无柄,鳞片形至披针形,长1—2.5毫米,宽0.5—0.8毫米,先端渐尖,基部钝,边缘膜质。花5数,1—3朵,顶生呈聚伞花序;花梗细,绿色,长7—17毫米;花萼开展,分裂至近基部,萼筒甚短,裂片披针形,长3.5—4.5毫米,先端渐尖,边缘宽膜质,中脉在背面呈脊状突起;花冠黄色,筒形,长8—10毫米,裂片椭圆形,长4—5毫米,先端钝,全缘;雄蕊着生于花冠裂片间弯缺处,与裂片互生,整齐,花丝丝状,长1.8—2毫米,花药矩圆形,长0.8—1毫米;子房无柄,椭圆形,长2—2.5毫米,花柱极长,线形,长3.5—4毫米,柱头2裂,裂片圆形。蒴果矩圆形或近圆球形,长2.5—3毫米;种子深褐色,有光泽,圆球形或宽矩圆形,长0.2—0.3毫米,表面具蜂窝状网隙。 花果期10月。

产云南。生于林下,海拔2300米。模式标本采自喜马拉雅山西部。尼泊尔、印度(卡西山脉)也有分布。