

或仅先端外露,淡褐色,长椭圆形,两端渐狭,长2—2.5厘米,宽约4毫米,果皮薄,柄长约2厘米;种子淡褐色,近圆形,直径约1毫米,具翅。花果期10月至翌年2月。

产云南、四川、贵州、甘肃、陕西、河南、湖北、广西。生于高山灌丛、草地及林下,海拔570—1750米。模式标本采自湖北宜昌。

全草入药,能清热、消炎、止咳;可治肝炎、支气管炎、小便不利等症。

107. 蔓枝龙胆 图版26: 8—12

Gentiana leptoclada Balf. f. et Forrest in Not. Bot. Gard. Edinb. **4**: 71. pl. 71. 1907; Marq. in Kew Bull. **1937**: 154. 1937. — *G. hapalocaula* Marq. l. c. **1928**: 52. 1928 et **1937**: 154. 1937, syn. nov.


一年生草本。根纤细、少分枝。茎蔓生,斜升,长可达30厘米,多分枝,纤细,圆形,具膜质细条棱,光滑无毛,节间长2—5厘米。基生叶椭圆形,长约15毫米,宽约6毫米,先端急尖,基部楔形,边缘浅波状;茎生叶宽卵形或心形,长10—15毫米,宽6—13毫米,先端急尖,基部圆形或心形,边缘软骨质,皱曲呈浅波状,叶脉5条,下面突起,沿脉疏被粗糙短毛或无毛,柄极短,扁平,长1—3毫米,背面沿脉被稀疏糙毛或无毛。花单生茎及分枝顶端,近无梗,基部具一对心形叶状苞叶;花萼膜质,倒锥形,萼筒长8—10毫米,近无翅,裂片披针形,长3—5毫米,弯缺圆形;花冠蓝色,狭钟形,长2.5—3(4)厘米,冠筒长约2厘米,裂片卵形,长7—8毫米,宽约5毫米,先端渐尖,褶近截形,宽3—4毫米,先端具短流苏;雄蕊着生于冠筒下部,不整齐,花丝线形,长约12毫米,花药矩圆形,长约2毫米;子房细长,圆柱形,长10—11毫米,具长5—6毫米的柄,花柱线形,长约9毫米,柱头2裂,向外反卷。蒴果淡褐色,矩圆形,长约2厘米,果皮膜质;种子棕褐色,圆形或卵形,长宽约相等,约1毫米,表面具增粗网纹。

产云南西北部(模式标本产地)。生于林下,海拔2100—3000米。

108. 条纹龙胆(拉汉种子植物名称) 图版24: 6—10

Gentiana striata Maxim. in Mém. Biol. Acad. Sci. St. Pétersb. **11**: 265. 1881 et in Bull. Acad. Sci. St.-Pétersb. **27**: 501. 1881; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 136. 1890; Kusnez. in Acta Hort. Petrop. **15**: 250. 1898; H. Smith in Hand. -Mazz. Symb. Sin. **7**: 950. 1936; Marq. in Kew Bull. **1937**: 153. 1937; K. S. Hao in Bot. Jahrb. **68**: 630. 1938. — *G. tricholoba* Franch. in Bull. Soc. Bot. France **43**: 490. 1896. — *G. schlechteriana* Limpr. in Fedde, Rep. Sp. Nov. Beih. **12**: 467. 1922.

一年生草本,高10—30厘米。根细、少分枝。茎淡紫色,直立或斜升,从基部分枝,节间长2—7厘米,具细条棱。茎生叶无柄,稀疏,长三角状披针形或卵状披针形,长1—3厘米,宽0.5—1.2厘米,先端渐尖,基部圆形或平截,抱茎呈短鞘,边缘粗糙或被短毛,下部边缘及基部毛稍密,叶脉1—3,下面沿中脉密被短柔毛,上部稀疏。花单生茎顶;花萼钟形,萼筒长1—1.3厘米,具狭翅,裂片披针形,长8—11毫米,先端尖,中脉突起下延呈翅,边



1—4. 报春花龙胆 *Gentiana primuliflora* Franch: 1. 花枝, 2. 花冠纵剖, 3. 果实, 4. 种子。
 5—7. 陆丰龙胆 *G. expansa* H. Smith: 5. 花枝, 6. 花冠纵剖, 7. 种子。 8—12. 蔓枝龙胆 *G. leptoclada* Balf. f. et Forrest: 8. 花枝, 9. 花冠纵剖, 10. 萼及流苏, 11. 雌蕊, 12. 种子。

(张海燕绘)