

2—3 毫米,两端渐狭,柄长 1—1.5 毫米,花柱线形,连柱头长 1—1.2 毫米,柱头 2 裂,裂片狭矩圆形。蒴果内藏,矩圆状匙形,连柄长 5.5—6 毫米,柄极短,先端钝圆,具宽翅,两侧边缘具由上至下渐狭的翅;种子淡褐色,有光泽,卵状椭圆形或椭圆形,长 0.7—0.8 毫米,表面具细网纹。 花果期 2 月。

产云南(禄劝,模式标本产地)。生于山谷干燥斜坡草地,海拔 2700 米。

210. 银萼龙胆

Gentiana albicalyx Burk. in Journ. Asiat. Soc. Bengal n. ser. **2**: 314. 1906; Hara, Chater et Williams, Enum. Fl. Pl. Nepal **3**: 91. 1982. — *G. capitata* var. *strobiliformis* C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**: 113. 1883; Hara, l. c. 254. syn. nov.

一年生草本,高 1.5—4 厘米。茎直立,下部单一,完全裸露无叶,具翅状细条棱,表皮易剥落,上部节间极短缩,密集着叶和多数小枝,聚呈头状,下部包围于叶丛中。叶密集,覆瓦状排列,近圆形至扇形,长 3—5 毫米,宽 3.5—6 毫米,先端圆形或截形,具外反的短小尖头,边缘白色膜质,宽约 0.5 毫米,平滑,两面光滑,中脉白色膜质,在下面呈龙骨状突起,叶柄白色膜质,光滑,连合成长 0.5—1 毫米的筒。花多数,单生于小枝顶端;近无花梗;花萼漏斗形,长 4—4.5 毫米,萼筒白色膜质,裂片绿色,圆形,矩圆形,长 1.2—1.5 毫米,先端圆形,具外反的短小尖头,边缘白色膜质,宽约 0.5 毫米,中脉白色膜质,在背面呈龙骨状突起,并向萼筒作短的下延,弯缺狭,截形;花冠上部蓝色,下部黄白色,筒状漏斗形,长 7—8 毫米,裂片宽卵形,长 1.2—1.5 毫米,先端钝圆,褶半圆形,长约 0.5 毫米,全缘或边缘有不明显圆齿;雄蕊着生于冠筒中部、整齐,花丝丝状钻形,长 1.5—2 毫米,花药矩圆形,长 0.5—0.7 毫米;子房披针形或椭圆形,长 1.5—2 毫米,两端渐狭,柄长 0.7—1 毫米,花柱线形,连柱头长 1—1.3 毫米,柱头 2 裂,裂片狭矩圆形。蒴果卵圆形,长约 2 毫米。

花果期 6 月。

产我国西藏(亚东,模式标本产地)。生于山坡草地,海拔 2600—4500 米。尼泊尔、锡金也有分布。

211. 头状龙胆

Gentiana capitata Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 126. 1825; Griseb. Gen. Sp. Gent. 275. 1838 et in DC. Prodr. **9**: 107. 1845; C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. **14**: 436. 1875 et in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**: 113. 1883; Kusnez. in Acta Hort. Petrop. **15**: 420. 1904; Marq. in Journ. Linn. Soc. Bot. **48**: 204. 1929 et in Kew Bull. **1937**: 188. 1937; Hara. Fl. E. Himal. 254. 1966; Hara, Chater et Williams, Enum. Fl. Pl. Nepal **3**: 92. 1982. — *Ericala capitata* D. Don in London Edinb. Philos. Mag. Journ. Sci. **8**: 76. 1836 et ex G. Don, Gen. Syst. Dichlam. Pl. **4**: 193. 1837 et in Trans. Linn. Soc. **17**: 512. 1837. — *Gentiana cephalodes* Edgew. in Trans. Linn. Soc. **20**: 84. 1846; Hara, Chater et Williams, i, c. 92.