

边缘有不整齐的波状齿，下部两侧具长的细条裂齿；腺体近球形，下垂；花丝线形，长17—21毫米，花药黄色，狭矩圆形，长约3毫米；子房披针状椭圆形，长3.5—4厘米，子房柄长8—11毫米，花柱线形，长3—5毫米。蒴果具柄，与花冠近等长；种子矩圆形，长约1毫米，褐色。花果期7—10月。

产云南西北部、四川西南部。生于水沟边、山谷河边、山坡草地，海拔2000—4050米。模式标本采自四川盐源。

5. 扁蓄(植物分类学报) 图版45: 6—9

Gentianopsis barbata (Fröel.) Ma, 植物分类学报1(1): 8. 1951; 中国高等植物图鉴3: 401. 图4755. 1974. —*Gentiana barbata* Fröel. Gent. Diss. 114. 1796: H. Smith in Bot. Not. 297. 1938; Kitag. in Rep. Inst. Sci. Res. Manch. 3. Append. 1: 358. 1939; Grossh. in Kom. Fl. URSS 18: 595. 1952; 东北植物检索表285. 图版91, 图6. 1959; Семиотр. в Павлов, Фл. Казах. 7: 110. 1964. —*G. detonsa* β. *barbata* Griseb. in DC. Prodr. 9: 101. 1845 —*Gentianopsis barbata* var. *sinensis* Ma, l. c. 9. 图版1. syn. nov. —*Gentiana detonsa* auct. non Rottb.: C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 118. 1883, excl. var.; Franch. Pl. David. 1: 210. 1884; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 127. 1890; Diels in Bot. Jahrb. 29: 537. 1900; Kom. Fl. Mansh. 3(1): 267. 1905; Forrest in Not. Bot. Gard. Edinb. 4: 70. 1907; Limpr. in Fedde, Rep. Sp. Nov. Beih. 12: 468. 1922; 中国北部植物图志2: 23. 图版6. 1933; K. S. Hao in Bot. Jahrb. 68: 629. 1938. —*Gentianella detonsa* auct. non (Rottb.) G. Don: H. Smith in Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 980. 1936, excl. H. Smith 7709.

5a. 扁蓄(原变种)

var. **barbata**

一年生或二年生草本，高8—40厘米。茎单生，直立，近圆柱形，下部单一，上部有分枝，条棱明显，有时带紫色。基生叶多对，常早落，匙形或线状倒披针形，长0.7—4厘米，宽0.4—1厘米，先端圆形，边缘具乳突，基部渐狭成柄，中脉在下面明显，叶柄长至0.6厘米；茎生叶3—10对，无柄，狭披针形至线形，长1.5—8厘米，宽0.3—0.9厘米，先端渐尖，边缘具乳突，基部钝，分离，中脉在下面明显。花单生茎或分枝顶端；花梗直立，近圆柱形，有明显的条棱，长达15厘米，果时更长；花萼筒状，稍扁，略短于花冠，或与花冠筒等长，裂片2对，不等长，异形，具白色膜质边缘，外对线状披针形，长7.5—20毫米，基部宽2—3毫米，先端尾状渐尖，内对卵状披针形，长6—12毫米，基部宽4—6毫米，先端渐尖，萼筒长10—18毫米，口部宽6—10毫米；花冠筒状漏斗形，筒部黄白色，檐部蓝色或淡蓝色，长2.5—5厘米，口部宽达12毫米，裂片椭圆形，长6—12毫米，宽6—8毫米，先端圆形，有小尖头，边缘有小齿，下部两侧有短的细条裂齿；腺体近球形，下垂；花丝线形，长8—12毫米，花药黄色，狭长圆形，长约3毫米；子房具柄，狭椭圆形，长2.5—3厘米，花柱短，长1—



1—5.福建蔓龙胆 *Crawfurdia pricei* (Marq.) H. Smith: 1.花枝, 2.茎生叶, 3.花冠纵剖,
4.花萼背面, 5.果实。6—7.毛叶蔓龙胆 *C. puberula* C. B. Clarke: 6.花枝, 7.叶片。

(张海燕绘)