

延于子房上部。蒴果披针形,与花冠等长;种子小,褐色,直径约 0.5 毫米。花果期 11 月。
产云南(丽江,模式标本产地)。生于山坡上。

18. 锡金肋柱花

Lomatogonium sikkimense (Burk.) H. Smith apud S. Nilsson in Grana Palyn. **7**(1): 110, 145. 1967; Hara, Chater et Williams, Enum. Fl. Pl. Nepal **3**: 95. 1982. — *Swertia sikkimensis* Burk. in Journ. Asiat. Soc. Bengal n. ser. **2**: 222. 1906; W. W. Smith et G. H. Cave in Rec. Bot. Surv. Ind. **4**: 224. 1911; S. Nilsson, l. c. **5**(3): 303. 1964.

一年生草本,高 2—7 厘米。茎从基部多分枝,稀不分枝,枝细瘦,斜升或直立,草黄色,有时带紫色,近四棱形,下部节间短,上部节间长。叶无柄,线状披针形至线形,长 9—17 毫米,宽 1.5—2.5 毫米,先端急尖,边缘干时外卷,基部钝,中脉在下面明显。聚伞花序生分枝顶端,花密集,近头状;花梗丝状,不等长,长至 10 毫米;花 5 数;花萼稍短于花冠,裂片线形或线状披针形,长 7—9 毫米,先端急尖,背面中脉细而明显;花冠在蕾中和花后期卷成狭筒形,深蓝色,裂片二色,深色的 1 侧外面具黑蓝色短条纹,卵状椭圆形,长 9—11 毫米,宽约 4 毫米,先端急尖,基部两侧各具 1 个腺窝,腺窝大、管形,上部边缘具裂片状流苏;花丝线形,长 3.5—4.5 毫米,花药蓝色,矩圆形,长约 2 毫米;子房无柄,长 5—5.5 毫米,柱头下延至子房上部。花期 9 月。

产我国西藏(亚东)。生于山坡草丛中,海拔 3980—4000 米。尼泊尔、锡金(模式标本产地)、不丹也有分布。

组 2. 小药组——Sect. *Pleurogynella* (Ikonn.) T. N. Ho, 高原生物学集刊 **1**: 43. 1982. — *Pleurogynella Ikonn.* in Not. Syst. Pl. Vasc. 270. 1969.

花药小,黄色,矩圆形或卵状矩圆形,长 0.5—1 毫米;腺窝 2 个,片状,位于花冠裂片基部的中央。

组模式: 短药肋柱花 *L. brachyantherum* (C. B. Clarke) Fern.

本组国产 2 种。

19. 短药肋柱花

Lomatogonium brachyantherum (C. B. Clarke) Fern. in Rhodora **21**: 197. 1919; Schmid in Fedde, Rep. Sp. Nov. **31**: 61. 1932, "Schmid"; S. Nilsson in Grana Palyn. **5**(3): 300. 1964 et **7**(1): 109. 1967; Hara, Chater et Williams, Enum. Fl. Pl. Nepal **3**: 95. 1982. — *Pleurogyne brachyanthera* C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**: 120. 1883; Hemsl. et Pears. in Journ. Linn. Soc. Bot. **35**: 191. 1902; Иконн. Муайянкундан, Раст. Памир. 200. 1963. — *Swertia brachyanthera* (C. B. Clarke) Knobl. in Bot. Centralbl. **60**(30): 388. 1894. — *Pleurogynella brachyanthera* (C. B.