

17: 522. 1837.—*Sczukinia* Turcz. in Bull. Soc. Nat. Most. **13: 167. 1840.**—Ser. *Ophelia* Benth. et Hook. f. Gen. Pl. **2: 817. 1876.**—Subgen. *Ophelia* C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4: 121. 1883.**—Grege *Ophelia* Franch. in Bull. Soc. Bot. France **46: 312. 1899.**

一年生或少数为多年生草本。茎有多数分枝。基生叶具短柄，花期枯落。聚伞花序的花小而多，4—5数，花冠裂片狭，先端尖，基部具1—2个腺窝或腺斑。种子表面常光滑。

组模式：狭叶獐牙菜 *S. angustifolia* Buch.-Ham. ex D. Don

本组国产 37 种。

系 1. 多年生系——Ser. Perennes T. N. Ho et S. W. Liu, 植物分类学报 **18(1): 82. 1980.**

多年生草本。茎单一或有分枝。基生叶发达。花冠裂片基部具1—2个杯状或囊状的腺窝。

37. 斜茎獐牙菜 金沙獐牙菜 (云南) 图版 61: 1—3

Swertia patens Burk. in Journ. Asiat. Soc. Bengal n. ser. **7: 82. 1911** et in Fedde, Rep. Sp. Nov. **10: 367. 1912**; H. Smith in Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7: 985. 1936**; S. Nilsson in Grana Palyn. **7(1): 111. 1967**; L. A. Lauen. in Not. Bot. Gard. Edinb. **37(1): 141. 1978—1979.**—*Pleurogyne mairei* Lévl. in Rep. Sp. Nov. **13: 258. 1914.**—*P. mairei* var. *rubro-punctata* Lévl. l. c. 258 et Cat. Pl. Yunnan **115. 1916.**—*P. vianotii* Lévl. in Bull. Geogr. Bot. **25: 22. 1915.**

多年生草本，高 10—15 厘米。根黄褐色，直径 3—4 毫米；茎多数，丛生，铺散，枝斜升，四棱形，具窄翅，翅上有乳突状短毛。基生叶常对折，狭匙形或狭倒披针形，连柄长 1.5—6.5 厘米，宽 0.4—0.5 厘米，先端急尖，基部渐狭成柄，仅中脉明显；茎生叶常对折，狭匙形或狭椭圆形至线形，连柄长 1.5—3.8 厘米，宽 0.2—0.4 厘米，先端钝或急尖，基部渐狭成柄，仅中脉明显突起。花单生枝顶，4 数，直径达 3 厘米；花梗粗，直立，长 1—2.2 厘米；花萼绿色，比花冠长得长，裂片苞叶状，包被花冠，不等大，外面 2 个大，卵状披针形，长 2—2.8 厘米，宽 0.5—0.9 厘米，内面 2 个小，披针形，长 1—2 厘米，宽至 0.5 厘米，全部裂片先端渐尖，基部心形或近圆形，背面具不明显的 3—7 脉；花冠白色，有紫色脉纹，裂片卵状矩圆形，长 1.3—1.5 厘米，宽达 0.6 厘米，先端钝，有短尖头，下部有 2 个腺窝，腺窝杯状，仅顶端边缘有短流苏；花丝窄锥形，长约 7 毫米，白色，花药蓝色，矩圆形，长约 2.5 毫米；子房无柄，卵形，长 8—10 毫米，花柱短，明显，柱头头状。花期 7—8 月。

产云南东北部及中部、四川南部。生于山坡草地，海拔 1100—2600 米。模式标本采自云南巧家。



1—3. 斜茎獐牙菜 *Swertia patens* Burk.: 1. 植株, 2. 花, 3. 腺窝。4—6. 川东獐牙菜 *S. davidii* Franch.: 4. 花枝, 5. 花, 6. 腺窝。7—9. 莲座獐牙菜 *S. rosularis* T. N. Ho et S. W. Liu: 7. 植株, 8. 花, 9. 腺窝。(王颖绘)