

1.5—1.7 厘米,基部直径 10 毫米,褐红色。 花期 5 月,果期 8 月。

产于云南南部。生于海拔 1500—2000 米山地潮湿密林中。模式标本采自建水。

3. 山橙(植物名实图考) 马骝藤、马骝橙藤(广东);猴子果(广西) 图版 7

Melodinus suaveolens Champ. ex Benth. in Kew Bull. Bot. **4**: 333. 1852; Benth. Fl. Hongkong. 218. 1861; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 94. 1889; K. Schum. in Engler u. Prantl, Natürl. Pflanzenfam. **4**, **2**: 123. 1895; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. **10**: 167. 1912; Tsiang in Sunyatsenia **3**: 124. 1936; 侯宽昭等, 广州植物志, 489. 1956; 中国高等植物图鉴, **3**: 417, 图 4788. 1974; 海南植物志, **3**: 221, 图 671. 1974. — *Lycimnia suaveolens* Hance in Walper, Ann. Bot. Syst. **3**: 30. 1852. — *Melodinus laetus* Champ. l. c. — *Melodinus monogynus* sensu Benth. l. c., non Roxb.

攀援木质藤本,长达 10 米,具乳汁,除花序被稀疏的柔毛外,其余无毛;小枝褐色。叶近革质,椭圆形或卵圆形,长 5—9.5 厘米,宽 1.8—4.5 厘米,顶端短渐尖,基部渐尖或圆形,叶面深绿色而有光泽;叶柄长约 8 毫米。聚伞花序顶生和腋生;花蕾顶端圆形或钝;花白色;花萼长约 3 毫米,被微毛,裂片卵圆形,顶端圆形或钝,边缘膜质;花冠筒长 1—1.4 厘米,外披微毛,裂片约为花冠筒的 1/2,或与之等长,基部稍狭,上部向一边扩大而成镰刀状或成斧形,具双齿;副花冠钟状或筒状,顶端成 5 裂片,伸出花冠喉外;雄蕊着生在花冠筒中部。浆果球形,顶端具钝头,直径 5—8 厘米,成熟时橙黄色或橙红色;种子多数,犬齿状或两侧扁平,长约 8 毫米,干时棕褐色。 花期 5—11 月,果期 8 月—翌年 1 月。


产于广东、广西等省区。常生于丘陵、山谷,攀援树木或石壁上。模式标本采自广东南部岛屿。

果实可药用,有治疝气、腹痛、小儿疳积,消化不良、睾丸炎等。藤皮纤维可编制麻绳、麻袋。

4. 台湾山橙(中国高等植物图鉴)

Melodinus angustifolius Hayata in Journ. Coll. Sci. Tokyo **30**: 193. 1911.

木质藤本,除花冠有微柔毛外,全株无毛;小枝具棱,节间长 1—2.5 厘米。叶近革质,披针形,稀狭长圆形,长 5—10 厘米,宽 0.6—2.3 厘米,端部渐尖,基部急尖或圆形;侧脉多数,明显,中脉在叶面略为陷入,在叶背凸起,边缘略为反卷;叶柄长 3 毫米。聚伞花序顶生,长 1.5—2.5 厘米,比叶为短,着花 3—12 朵;总花梗长约 1 厘米;花梗长 2—3 毫米;苞片与小苞片卵圆形,长约 1.5 毫米;花萼裂片圆形,长约 1.5 毫



图版 7 山橙 *Melodinus suaveolens* Champ. ex Benth., 1.花枝; 2.花; 3.花冠展开;
4.浆果。(吴翠云绘)