

1.5—1.7 厘米,基部直径 10 毫米,褐红色。 花期 5 月,果期 8 月。

产于云南南部。生于海拔 1500—2000 米山地潮湿密林中。模式标本采自建水。

3. 山橙(植物名实图考) 马骝藤、马骝橙藤(广东);猴子果(广西) 图版 7

Melodinus suaveolens Champ. ex Benth. in Kew Bull. Bot. **4**: 333. 1852; Benth. Fl. Hongkong. 218. 1861; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 94. 1889; K. Schum. in Engler u. Prantl, Natürl. Pflanzenfam. **4**, **2**: 123. 1895; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. **10**: 167. 1912; Tsiang in Sunyatsenia **3**: 124. 1936; 侯宽昭等, 广州植物志, 489. 1956; 中国高等植物图鉴, **3**: 417, 图 4788. 1974; 海南植物志, **3**: 221, 图 671. 1974. —*Lycimnia suaveolens* Hance in Walper, Ann. Bot. Syst. **3**: 30. 1852. —*Melodinus laetus* Champ. l. c. —*Melodinus monogynus* sensu Benth. l. c., non Roxb.

攀援木质藤本,长达 10 米,具乳汁,除花序被稀疏的柔毛外,其余无毛;小枝褐色。叶近革质,椭圆形或卵圆形,长 5—9.5 厘米,宽 1.8—4.5 厘米,顶端短渐尖,基部渐尖或圆形,叶面深绿色而有光泽;叶柄长约 8 毫米。聚伞花序顶生和腋生;花蕾顶端圆形或钝;花白色;花萼长约 3 毫米,被微毛,裂片卵圆形,顶端圆形或钝,边缘膜质;花冠筒长 1—1.4 厘米,外披微毛,裂片约为花冠筒的 1/2,或与之等长,基部稍狭,上部向一边扩大而成镰刀状或成斧形,具双齿;副花冠钟状或筒状,顶端成 5 裂片,伸出花冠喉外;雄蕊着生在花冠筒中部。浆果球形,顶端具钝头,直径 5—8 厘米,成熟时橙黄色或橙红色;种子多数,犬齿状或两侧扁平,长约 8 毫米,干时棕褐色。 花期 5—11 月,果期 8 月—翌年 1 月。

产于广东、广西等省区。常生于丘陵、山谷,攀援树木或石壁上。模式标本采自广东南部岛屿。

果实可药用,有治疝气、腹痛、小儿疳积,消化不良、睾丸炎等。藤皮纤维可编制麻绳、麻袋。

4. 台湾山橙(中国高等植物图鉴)

Melodinus angustifolius Hayata in Journ. Coll. Sci. Tokyo **30**: 193. 1911.

木质藤本,除花冠有微柔毛外,全株无毛;小枝具棱,节间长 1—2.5 厘米。叶近革质,披针形,稀狭长圆形,长 5—10 厘米,宽 0.6—2.3 厘米,端部渐尖,基部急尖或圆形;侧脉多数,明显,中脉在叶面略为陷入,在叶背凸起,边缘略为反卷;叶柄长 3 毫米。聚伞花序顶生,长 1.5—2.5 厘米,比叶为短,着花 3—12 朵;总花梗长约 1 厘米;花梗长 2—3 毫米;苞片与小苞片卵圆形,长约 1.5 毫米;花萼裂片圆形,长约 1.5 毫

米,端部有微缘毛;花冠长约6毫米,直径7—10毫米,裂片圆形。浆果橙红色,椭圆形,长5.5厘米,直径3厘米,端部急尖,基部钝。花期夏秋,果期翌年春季。

产于我国台湾能高山、恒春、台东。生于海拔1000米山地林中;在台北植物园也有栽培。

5. 思茅山橙(中国高等植物图鉴) 岩山枝(贵州)

Melodinus henryi Craib in Kew Bull. 1911: 411. 1911; Pitard in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 3: 1111. 1933; Tsiang in Sunyatsenia 3: 127. 1936, 静生汇报, 9: 14. 1939.

粗壮木质藤本,除花序有微柔毛外,其余无毛;茎皮灰棕色,具条纹,节间长3—8厘米。叶近革质,椭圆状长圆形至披针形,长6—19厘米,宽2.2—6.5厘米,端部急尖或渐尖,基部楔形,有时小叶夹在大叶中间;侧脉多数,向上弧形上升,直达边缘;叶柄长0.6—1厘米。聚伞花序生于顶端的叶腋内,长4—5.5厘米,着花稠密;花萼裂片圆形,长2毫米,边缘薄膜质,被缘毛;花冠白色,长6毫米,直径7毫米,裂片卵圆形;花冠筒喉内的鳞片2裂,被长柔毛;雄蕊着生于花冠筒中部之下。浆果橙红色,长椭圆形,长9厘米,直径5厘米,具钝尖头,基部圆形;种子扁,长圆形或卵圆形,长13毫米,宽7毫米。花期4—5月,果期9—11月。

产于云南南部。生于海拔760—2800米山地林中。分布于泰国、缅甸。模式标本采自云南思茅。

果成熟时可食。果实可药用,治小儿脑膜炎、骨折等。

6. 景东山橙(中国高等植物图鉴)

Melodinus khasianus Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 629. 1882; K. Schum. in Engl u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4, 2: 123. 1895; Tsiang in Sunyatsenia 3: 127. 1936.

木质藤本,除花梗、花萼、花冠有柔毛外,其余无毛;节间长2.5—8厘米。叶椭圆状长圆形,长6—11.5厘米,宽1.5—3厘米,有达4厘米,端部短渐尖,基部楔形,叶面深绿色具光泽,叶背淡绿色;侧脉多数,中脉在叶背凸起;叶柄长6—7毫米。聚伞花序生于侧枝顶端的叶腋内,长2.5—6.5厘米,着花稀疏,最多不超过15朵;花萼裂片圆形,长3毫米,边缘薄膜质,被缘毛;花冠白色,长0.8厘米,直径1.1厘米,裂片圆形;花冠筒喉部鳞片长方形,端部高低不齐。浆果橙红色,卵圆形,长5.5厘米,直径4厘米。花期10月,果期10—11月。

产于云南和贵州。生于海拔1600—2900米湿润山谷森林中。印度也有。模式标本采自印度。