

米,端部有微缘毛;花冠长约6毫米,直径7—10毫米,裂片圆形。浆果橙红色,椭圆形,长5.5厘米,直径3厘米,端部急尖,基部钝。花期夏秋,果期翌年春季。

产于我国台湾能高山、恒春、台东。生于海拔1000米山地林中;在台北植物园也有栽培。

5. 思茅山橙(中国高等植物图鉴) 岩山枝(贵州)

Melodinus henryi Craib in Kew Bull. 1911: 411. 1911; Pitard in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 3: 1111. 1933; Tsiang in Sunyatsenia 3: 127. 1936, 静生汇报, 9: 14. 1939.

粗壮木质藤本,除花序有微柔毛外,其余无毛;茎皮灰棕色,具条纹,节间长3—8厘米。叶近革质,椭圆状长圆形至披针形,长6—19厘米,宽2.2—6.5厘米,端部急尖或渐尖,基部楔形,有时小叶夹在大叶中间;侧脉多数,向上弧形上升,直达边缘;叶柄长0.6—1厘米。聚伞花序生于顶端的叶腋内,长4—5.5厘米,着花稠密;花萼裂片圆形,长2毫米,边缘薄膜质,被缘毛;花冠白色,长6毫米,直径7毫米,裂片卵圆形;花冠筒喉内的鳞片2裂,被长柔毛;雄蕊着生于花冠筒中部之下。浆果橙红色,长椭圆形,长9厘米,直径5厘米,具钝尖头,基部圆形;种子扁,长圆形或卵圆形,长13毫米,宽7毫米。花期4—5月,果期9—11月。

产于云南南部。生于海拔760—2800米山地林中。分布于泰国、缅甸。模式标本采自云南思茅。

果成熟时可食。果实可药用,治小儿脑膜炎、骨折等。

6. 景东山橙(中国高等植物图鉴)

Melodinus khasianus Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 629. 1882; K. Schum. in Engl u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4, 2: 123. 1895; Tsiang in Sunyatsenia 3: 127. 1936.

木质藤本,除花梗、花萼、花冠有柔毛外,其余无毛;节间长2.5—8厘米。叶椭圆状长圆形,长6—11.5厘米,宽1.5—3厘米,有达4厘米,端部短渐尖,基部楔形,叶面深绿色具光泽,叶背淡绿色;侧脉多数,中脉在叶背凸起;叶柄长6—7毫米。聚伞花序生于侧枝顶端的叶腋内,长2.5—6.5厘米,着花稀疏,最多不超过15朵;花萼裂片圆形,长3毫米,边缘薄膜质,被缘毛;花冠白色,长0.8厘米,直径1.1厘米,裂片圆形;花冠筒喉部鳞片长方形,端部高低不齐。浆果橙红色,卵圆形,长5.5厘米,直径4厘米。花期10月,果期10—11月。

产于云南和贵州。生于海拔1600—2900米湿润山谷森林中。印度也有。模式标本采自印度。