

米,端部有微缘毛;花冠长约6毫米,直径7—10毫米,裂片圆形。浆果橙红色,椭圆形,长5.5厘米,直径3厘米,端部急尖,基部钝。花期夏秋,果期翌年春季。

产于我国台湾能高山、恒春、台东。生于海拔1000米山地林中;在台北植物园也有栽培。

5. 思茅山橙(中国高等植物图鉴) 岩山枝(贵州)

Melodinus henryi Craib in Kew Bull. 1911: 411. 1911; Pitard in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 3: 1111. 1933; Tsiang in Sunyatsenia 3: 127. 1936, 静生汇报, 9: 14. 1939.

粗壮木质藤本,除花序有微柔毛外,其余无毛;茎皮灰棕色,具条纹,节间长3—8厘米。叶近革质,椭圆状长圆形至披针形,长6—19厘米,宽2.2—6.5厘米,端部急尖或渐尖,基部楔形,有时小叶夹在大叶中间;侧脉多数,向上弧形上升,直达边缘;叶柄长0.6—1厘米。聚伞花序生于顶端的叶腋内,长4—5.5厘米,着花稠密;花萼裂片圆形,长2毫米,边缘薄膜质,被缘毛;花冠白色,长6毫米,直径7毫米,裂片卵圆形;花冠筒喉内的鳞片2裂,被长柔毛;雄蕊着生于花冠筒中部之下。浆果橙红色,长椭圆形,长9厘米,直径5厘米,具钝尖头,基部圆形;种子扁,长圆形或卵圆形,长13毫米,宽7毫米。花期4—5月,果期9—11月。

产于云南南部。生于海拔760—2800米山地林中。分布于泰国、缅甸。模式标本采自云南思茅。

果成熟时可食。果实可药用,治小儿脑膜炎、骨折等。

6. 景东山橙(中国高等植物图鉴)

Melodinus khasianus Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 629. 1882; K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4, 2: 123. 1895; Tsiang in Sunyatsenia 3: 127. 1936.

木质藤本,除花梗、花萼、花冠有柔毛外,其余无毛;节间长2.5—8厘米。叶椭圆状长圆形,长6—11.5厘米,宽1.5—3厘米,有达4厘米,端部短渐尖,基部楔形,叶面深绿色具光泽,叶背淡绿色;侧脉多数,中脉在叶背凸起;叶柄长6—7毫米。聚伞花序生于侧枝顶端的叶腋内,长2.5—6.5厘米,着花稀疏,最多不超过15朵;花萼裂片圆形,长3毫米,边缘薄膜质,被缘毛;花冠白色,长0.8厘米,直径1.1厘米,裂片圆形;花冠筒喉部鳞片长方形,端部高低不齐。浆果橙红色,卵圆形,长5.5厘米,直径4厘米。花期10月,果期10—11月。

产于云南和贵州。生于海拔1600—2900米湿润山谷森林中。印度也有。模式标本采自印度。

果成熟时可食。

7. 茶藤(广西) 大山橙(俗称)

Melodinus magnificus Tsiang in Sunyatsenia **3**: 128, Pl. 14. 1936; 中国高等植物图鉴, **3**: 418, 图 4789. 1974.

攀援木质藤本; 小枝黑褐色, 具乳汁, 被锈色短柔毛, 节间长 5.5—8 厘米。叶近革质, 除中脉与叶柄被柔毛外, 其余均无毛; 叶长圆状披针形, 长 12—21 厘米, 宽 4—6.5 厘米, 顶端渐尖或稀具钝的尖头, 基部楔形, 叶面亮绿色, 中脉下陷, 叶背淡绿色, 中脉凸起; 侧脉 15—20 对, 近平行, 网脉明显; 叶柄被微短柔毛, 上面具槽, 长 6—8 毫米; 叶腋内具有小腺体, 腺体急尖, 长约 1 毫米。聚伞花序顶生, 比叶为短; 花蕾长圆形, 顶端钝头; 小苞片线状披针形, 被短柔毛, 长 3—5 毫米; 花萼 5 深裂, 裂片长圆形, 顶端急尖, 长约 6 毫米, 基部宽 3 毫米, 外面被短柔毛, 内面无毛, 边缘通常较厚, 具细缘毛, 基部内面无腺体; 花冠白色, 高脚碟状, 外面被微柔毛, 花冠筒圆筒状, 长 1.5—1.7 厘米, 中部以下较窄, 内面被短柔毛, 花冠裂片向左覆盖, 偏斜倒卵形, 长 1.5—1.8 厘米, 中部宽达 1.2 厘米, 基部狭窄, 具脉纹, 被短柔毛; 副花冠鳞片状, 贴生于花冠筒喉部, 被疏柔毛, 顶端 2 裂; 雄蕊着生于花冠筒的中部之下, 花丝短, 被疏柔毛, 下延至花冠筒的基部, 花药长圆状三角形, 长 2 毫米, 短渐尖; 雌蕊无毛, 子房 2 室, 胚珠多数, 花柱线状, 长约 3 毫米, 柱头圆锥状, 渐尖, 长约 2 毫米, 顶端 2 裂。浆果椭圆形, 具尖头, 黄色, 长 6—8 厘米。 花期 6—7 月, 果期 10—12 月。

产于广西南部。生于山地疏林中及山坡向阳处。模式标本采自瑶山。

叶揉制作茶饮料, 有兴奋作用。

8. 薄叶山橙(植物分类学报) 图版 8

Melodinus tenuicaudatus Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica **11**: 353, Pl. 38. 1973.

攀援灌木, 长 1.5—2 米; 枝灰色, 无毛; 小枝灰黄色, 几无毛。叶薄膜质, 无毛, 长圆形至长圆状披针形, 长 6—14.5 厘米, 宽 1.5—4 厘米, 基部楔形至宽楔形, 顶端窄尾状, 尾尖长 1—1.5 厘米; 中脉在叶面略凹陷, 在叶背凸起, 侧脉纤细, 很多, 两面近扁平; 叶柄长约 5 毫米, 被微毛。聚伞花序伞形状, 顶生, 着花 3—5 朵, 长 4—5.5 厘米; 花序梗长约 1.2 厘米, 被微毛, 花梗长约 5 毫米, 被微毛; 苞片和小苞片披针形, 长 2.5—4 毫米; 花萼 5 深裂, 外面被微毛, 裂片双盖覆瓦状排列, 卵圆形, 顶端钝; 花冠白色, 高脚碟状, 花冠裂片长圆形, 向左覆盖, 长 1.8 厘米, 宽 5—7 毫米, 顶端钝或浑圆, 无毛, 花冠筒圆筒状, 长 1.8 厘米, 外面无毛, 内面被短柔毛; 副花冠鳞片状, 着生于冠筒的喉