

部;雄蕊在冠筒的近基部着生,花丝被微毛,花药长圆状披针形,长3毫米;雌蕊长5.5毫米,子房2室,无毛,每室有胚珠多颗,花柱丝状,柱头喙状,顶端2裂。浆果椭圆状,长6.5—7厘米,直径1.8—2.5厘米,两端渐尖或基部钝。花期5—9月,果期9—翌年3月。

产于广西和云南等省区。生于海拔750—1800米山地密林中或灌木丛中。模式标本采自广西龙州。

9. 龙州山橙(中国高等植物图鉴)

Melodinus morsei Tsiang in Sunyatsenia **6**: 110, Pl. 19. 1941.——*Melodinus seguini* sensu Schneid. in Sarg. Pl. Wils. **3**: 331. 1916. p. p. quoad Morse 171, non Lévillé.

攀援灌木;枝和小枝被红黄色短绒毛,圆筒形,直径1—3毫米,具疏皮孔;节间长1—3厘米。叶近革质,广卵形,稀卵圆状长圆形,长4.5—9厘米,宽2—6.8厘米,顶端短渐尖,基部圆形,干时黄褐色,叶面略有亮光,几无毛,叶背淡绿色,被有红黄色短绒毛,边缘略为外卷;中脉在叶面陷入而被绒毛,在叶背凸起,侧脉8—10对,在叶面扁平,在叶背略凸起,斜行上升,到边缘网结;叶柄长约5毫米,具红黄色绒毛,上面有沟槽。聚伞花序三出圆锥状,顶生或生于顶枝的叶腋间,着花6—8朵;总花梗长1—2厘米,被红黄色绒毛;花梗长3毫米,被红黄色绒毛;小苞片卵圆状披针形,长3毫米,被红黄色绒毛;花萼近钟状,外面有红黄色绒毛,裂片双盖覆瓦状排列,内面基部无腺体,裂片卵圆形或长圆状卵圆形,长3—4毫米,宽2—2.5毫米,端部急尖,边缘有缘毛;花冠白色,狭高脚碟状,花冠筒长圆筒状,长1.5厘米,直径2毫米,在花腋之上开展,被红黄色短绒毛,花冠裂片向左覆盖,狭镰刀状长圆形或披针形,长13毫米,中部宽约4毫米,在基部有1齿;花冠筒喉部内面具有5个鳞片,鳞片狭长圆形,被短疏柔毛,顶端2裂,离生;雄蕊着生于花冠筒上部,花丝极短,被疏柔毛,花药长圆状披针形,基部圆形;子房球形,无毛,花柱丝状,柱头长圆筒形,无毛,顶端2裂。浆果纺锤形,长8.5厘米,直径2厘米,端部渐尖,基部狭楔形,外果皮光滑,橙黄色;种子多数,近圆形,直径6毫米。花期8—10月,果期冬季至翌年春初。

产于广西西南部。生于山地林中。模式标本采自龙州。

10. 川山橙(峨眉植物图志) 图版9

Melodinus hemsleyanus Diels in Engl. Bot. Jahrb. **29**: 539. 1900; Schneid. in Sarg. Pl. Wils. **3**: 331. 1916; Tsiang in Sunyatsenia **3**: 130. 1936, et in Fang, Ic Pl. Omci. **1**(2): Pl. 88. 1944; 中国高等植物图鉴, **3**: 418, 图 4790. 1974.——