

Melodinus? sp. nov. Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 94. 1889; *Trachelospermum esquirolii* Lév. Fl. Kouy-Tchéou 32. 1914.——*Melodinus monogynus* sensu Schneid. in Sarg. Pl. Wils. **3**: 336. 1916, in nota, non Roxb.——*Melodinus khasianus* sensu Woodson in Journ. Arn. Arb. **15**: 313. 1934, non Hooker f.——*Melodinus seguini* sensu Woodson l. c. et Tsiang l. c. 131, p. p., quoad F. T. Wang 23181, non Lév.

粗壮木质藤本，长约6米，具乳汁；小枝、幼叶、叶柄、花序密被短绒毛；茎皮黄绿色。叶近革质，椭圆形或长圆形，稀椭圆状披针形，长7—15厘米，宽4—5厘米，顶端渐尖，基部楔形或钝；叶面具光泽，被毛脱落，叶背中脉明显，被短柔毛；叶柄长约5毫米。聚伞花序生于侧枝之顶端；花蕾长圆形，顶端钝头；花白色；花萼长达7毫米，宽约4毫米，裂片椭圆状长圆形，具尖头，边缘通常较厚，外被密柔毛；花冠筒长约1厘米，外被微毛，花冠裂片长圆状披针形或长披针形，中部以下扩大，长约8毫米；副花冠小，鳞片状；雄蕊着生于花冠筒下部的膨大处，花丝长1.5毫米，花药与花丝等长，顶端渐尖，子房2室，花柱短，柱头扩大成圆柱状。浆果椭圆形，具尖头，长达7.5厘米，直径约2.9厘米，成熟时橙黄色或桔红色；种子多数，长椭圆形或两侧压扁，长9毫米，宽约5毫米。花期5—8月，果期7—12月。

产于贵州、四川南部和东南部，以峨眉山为多。生于海拔500—1500米的山地疏林、山坡、路旁、岩石上。模式标本采自峨眉山。

11. 尖山橙(广东) 竹藤、藤皮黄、鸡腿果、石芽枫(广西)

Melodinus fusiformis Champ. ex Benth. in Hook. Kew Bull. Bot. **4**: 332. 1852; Benth. Fl. Hongkong. 218. 1861; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 93. 1889; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. **10**: 167. 1912; Tsiang in Sunyatsenia **3**: 132. 1936; 中国高等植物图鉴, **3**: 419, 图 4791. 1974.——*M. seguini* Lév. in Fedde Repert. Sp. Nov. **2**: 114. 1906, et Fl. Kouy-Tchéou 30. 1914; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 989. 1936; Tsiang in Sunyatsenia **3**: 131. 1936.——*M. fluvus* Lév. l. c. **11**: 548. 1913.——*M. esquirolii* Lév. l. c. 549.——*M. edulis* Lév. l. c. 549, et Fl. Kouy-Tchéou 30. 1914.——*M. wrightioides* Hand.-Mazz. in Beih. Centr. **56**: Abt. B. 460. 1937.

粗壮木质藤本，具乳汁；茎皮灰褐色；幼枝、嫩叶、叶柄、花序被短柔毛，老渐无毛；节间长2.5—11厘米。叶近革质，椭圆形或长椭圆形，稀椭圆状披针形，长4.5—12厘米，宽1—5.3厘米，端部渐尖，基部楔形至圆形；中脉在叶面扁平，在叶背略为凸起，侧脉约15对，向上斜升到叶缘网结；叶柄长4—6毫米。聚伞花序生于侧枝的顶端，

着花 6—12 朵,长 3—5 厘米,比叶为短;花序梗、花梗、苞片、小苞片、花萼和花冠均疏被短柔毛;花梗长 0.5—1 厘米;花萼裂片卵圆形,边缘薄膜质,端部急尖,长 4—5 毫米;花冠白色,花冠裂片长卵圆形或倒披针形,偏斜不正;副花冠呈鳞片状在花喉中稍为伸出,鳞片顶端 2—3 裂;雄蕊着生于花冠筒的近基部。浆果橙红色,椭圆形,顶端短尖,长 3.5—5.3 厘米,直径 2.2—4 厘米;种子压扁,近圆形或长圆形,边缘不规则波状,直径 0.5 厘米。 花期 4—9 月,果期 6 月—翌年 3 月。

产于广东、广西和贵州等省区。生于海拔 300—1400 米山地疏林中或山坡路旁、山谷水沟旁。模式标本采自广东南部岛屿。

全株供药用,民间称可活血、祛风、补肺、通乳和治风湿性心脏病等。

4. 奶子藤属*——*Bousignonia* Pierre

Pierre in L. Planch. Prodr. Apocyn. 324. 1894.

攀援灌木。叶对生,羽状脉。聚伞花序顶生或腋生;花萼 5 裂,裂片双盖覆瓦状排列,内面基部腺体多数;花冠高脚碟状,基部略膨大,花冠裂片 5 枚,卵圆形,向左覆盖,向内弯曲;雄蕊 5 枚,离生,隐藏在花冠筒喉部之内,着生在花冠筒的中部,花丝短,花药长圆状披针形;花盘圆筒状,厚肉质,顶端全缘或微缺;子房 1 室,2 个胎座,每胎座有胚珠 2 颗,花柱短,柱头卵圆形,具尖头,顶端 2 裂。浆果肉质,内有种子 3—4 个,种皮脆骨质;胚大;胚根短。

约 2 种,产于我国和越南。

本属模式种为: *Bousignonia mekongensis* Pierre

《印度支那植物志》(Pitard in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 3: 1095—1098. 1933.) 记载本属子房每胎座有胚珠 4 颗。现根据我国云南标本及越南标本重新解剖结果,本属子房每胎座有胚珠 2 颗。本属子房 1 室 2 个胎座共胚珠才 4 颗,而《印度支那植物志》中记载子房每胎座有 4 颗,恐怕是错误的。

分 种 检 索 表

1. 叶具短尖头,尖头长不超过 5 毫米;侧脉每边 8—12 条,极明显;花盘被毛 1. 奶子藤 *B. mekongensis* Pierre
1. 叶具尾状长尖,尖头长 5—10 毫米;侧脉每边 20—25 条,略明显;花盘无毛 2. 网奶果 *B. angustifolia* Pierre

* 奶子藤属(中国高等植物图鉴),别名酸锡岗属(中国种子植物科属辞典)。