

着花 6—12 朵,长 3—5 厘米,比叶为短;花序梗、花梗、苞片、小苞片、花萼和花冠均疏被短柔毛;花梗长 0.5—1 厘米;花萼裂片卵圆形,边缘薄膜质,端部急尖,长 4—5 毫米;花冠白色,花冠裂片长卵圆形或倒披针形,偏斜不正;副花冠呈鳞片状在花喉中稍为伸出,鳞片顶端 2—3 裂;雄蕊着生于花冠筒的近基部。浆果橙红色,椭圆形,顶端短尖,长 3.5—5.3 厘米,直径 2.2—4 厘米;种子压扁,近圆形或长圆形,边缘不规则波状,直径 0.5 厘米。 花期 4—9 月,果期 6 月—翌年 3 月。

产于广东、广西和贵州等省区。生于海拔 300—1400 米山地疏林中或山坡路旁、山谷水沟旁。模式标本采自广东南部岛屿。

全株供药用,民间称可活血、祛风、补肺、通乳和治风湿性心脏病等。

4. 奶子藤属*——*Bousignonia* Pierre

Pierre in L. Planch. Prodr. Apocyn. 324. 1894.

攀援灌木。叶对生,羽状脉。聚伞花序顶生或腋生;花萼 5 裂,裂片双盖覆瓦状排列,内面基部腺体多数;花冠高脚碟状,基部略膨大,花冠裂片 5 枚,卵圆形,向左覆盖,向内弯曲;雄蕊 5 枚,离生,隐藏在花冠筒喉部之内,着生在花冠筒的中部,花丝短,花药长圆状披针形;花盘圆筒状,厚肉质,顶端全缘或微缺;子房 1 室,2 个胎座,每胎座有胚珠 2 颗,花柱短,柱头卵圆形,具尖头,顶端 2 裂。浆果肉质,内有种子 3—4 个,种皮脆骨质;胚大;胚根短。

约 2 种,产于我国和越南。

本属模式种为: *Bousignonia mekongensis* Pierre

《印度支那植物志》(Pitard in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 3: 1095—1098. 1933.) 记载本属子房每胎座有胚珠 4 颗。现根据我国云南标本及越南标本重新解剖结果,本属子房每胎座有胚珠 2 颗。本属子房 1 室 2 个胎座共胚珠才 4 颗,而《印度支那植物志》中记载子房每胎座有 4 颗,恐怕是错误的。

分 种 检 索 表

1. 叶具短尖头,尖头长不超过 5 毫米;侧脉每边 8—12 条,极明显;花盘被毛 1. 奶子藤 *B. mekongensis* Pierre
1. 叶具尾状长尖,尖头长 5—10 毫米;侧脉每边 20—25 条,略明显;花盘无毛 2. 网奶果 *B. angustifolia* Pierre

* 奶子藤属(中国高等植物图鉴),别名酸锡岗属(中国种子植物科属辞典)。