

1. 奶子藤(云南) 图版 10

Bousigonia mekongensis Pierre in L. Planch. Prodr. Apocyn. 324. 1894; Pitard in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 3: 1096, fig. 126 (1—4). 1933; Tsiang in Sunyatsenia 6: 112. 1941; 中国高等植物图鉴, 3: 419, 图 4792. 1974.

攀援灌木, 长达 10 米, 具乳汁, 嫩枝及花梗被微柔毛外, 其余均无毛。叶近革质, 长圆形, 长 6—15 厘米, 宽 2—4.8 厘米, 顶端急尖, 具短尖头, 尖头长不超过 5 毫米; 叶脉在叶面微陷凹, 叶背显著凸起, 侧脉每边 8—12 条, 疏离, 几乎平行, 脉端略斜上升, 叶缘前与上脉网结; 叶柄长 1.5—1.8 厘米。聚伞花序顶生或腋生; 总花梗长 5—11 厘米, 第二歧长 2—5 厘米; 花梗长 2—10 毫米; 苞片与小苞片三角形, 长约 1 毫米; 花萼卵圆形, 边缘有纤毛, 长约 1.5 毫米, 基部内面有腺体多数; 花冠白色, 花冠筒长 7 毫米, 花冠裂片卵圆形, 长 2 毫米; 雄蕊着生于花冠筒的中部, 花药长圆状披针形; 花盘圆筒状, 比子房短, 顶端全缘或微缺, 被毛; 子房 1 室, 2 个胎座, 每胎座有胚珠 2 颗。浆果圆球状, 绿色, 长 3—5 厘米, 直径约 4 厘米。 花期 4—6 月, 果期 8 月—翌年 1 月。

产于云南的屏边、河口、蒙自、易武、金屏等地。生于海拔 500—800 米山地疏林中或河旁潮湿地方。越南也有。模式标本采自越南。

2. 闷奶果(云南)

Bousigonia angustifolia Pierre in Spire, Apocyn. Indo-Chine 129. 1905, et Caout. Indo-Chine 129. 1906; Pitard in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 3: 1098. fig. 126(5)—127(1—2). 1933.

攀援灌木, 除嫩枝、花序被微毛外, 其余均无毛。叶长圆形或长圆状披针形, 长 7—15 厘米, 宽 2—4 厘米, 基部楔形至狭圆形, 顶端具尾状长尖, 尾尖长 5—10 毫米; 侧脉每边 20—25 条, 在叶背凸起, 脉端网结; 叶柄长 1—1.5 厘米。聚伞花序顶生或腋生, 长 4—5.5 厘米; 苞片与小苞片三角形, 长约 2 毫米; 花萼卵圆形, 有缘毛, 长 3 毫米, 基部内面腺体多数; 花冠白色, 花冠筒下部膨大, 喉部紧缩, 长 7 毫米, 花冠裂片卵圆形, 长和宽约 3 毫米; 雄蕊着生于花冠筒的中部, 花药长圆状披针形, 长 2 毫米, 钝头, 基部两裂; 花盘圆筒状, 比子房短, 顶端全缘或微缺, 无毛; 子房 1 室, 2 个胎座, 每胎座有胚珠 2 颗, 花柱短, 柱头卵圆形, 顶端 2 裂。浆果卵圆形, 绿色, 长 2—3 厘米, 直径 1.5—3 厘米。 花期春夏两季, 果期秋冬至翌年春季。

产于云南省的景洪、屏边、勐遮、勐海等地。生于海拔 860—1830 米山地疏林中或林缘湿润地方。越南、老挝也有。模式标本采自老挝。