

约 39 种,分布于从马达加斯加大洋洲的波利尼西亚。我国栽培 2 种。

本属模式种为: *Ochrosia borbonica* Gmelin

分种检索表

1. 叶近革质,顶部钝或圆形…………… 1. 玫瑰树 *O. borbonica* Gmelin
1. 叶薄纸质或膜质,顶部具短尖头…………… 2. 古城玫瑰树 *O. elliptica* Labill.

1. 玫瑰树(中国高等植物图鉴) 图版 13

Ochrosia borbonica Gmelin, Syst. Veg. 1: 439. 1796; Pitard in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 3: 1131. 1933; Tsiang in Sunyatsenia 3: 137. 1936; 中国高等植物图鉴, 3: 421, 图 4795. 1974.

乔木,高约 4 米;小枝灰白色,节间长约 1 厘米。叶在枝的上部 3—4 片轮生,下部对生,近革质,倒卵形,长 8—15 厘米,宽 3—5 厘米,顶端钝或圆形,基部楔形,叶面亮绿色,叶背淡绿色,叶缘略向下反卷;中脉在叶面凹陷,在叶背略为凸起,侧脉多数,几乎平行,两面均扁平;叶柄长 1—2 厘米。聚伞花序伞形状或伞房状,长约 3 厘米;花萼裂片卵圆形,长 2 毫米,宽 1.5 毫米;花冠白色,高脚碟状,花冠筒圆筒状,上部膨大,外面无毛,内面在中部以下被短柔毛,长 11 毫米,花冠裂片长圆形,长 8 毫米,宽 3.5 毫米;雄蕊着生于花冠筒中部之上,花药内藏;子房由 2 个离生心皮所组成,椭圆形,无毛,花柱长 6 毫米,柱头顶端具小尖头。核果 2 个,肉质、红色,长约 4.5 厘米,直径 3.5 厘米,内有种子 3 个。花期 6 月,果期 6—9 月。

广东南部栽培。分布于马来西亚、新加坡、印度尼西亚、越南、斯里兰卡和马达加斯加等。模式标本采自马达加斯加。

2. 古城玫瑰树(新拟)

Ochrosia elliptica Labill. Sert. Austr.-Caled. 25. t. 30. 1824; F. M. Bail. Quensl. Fl. 1: 982, Pl. 41 et 42, f. 4. 1899.

乔木,有丰富乳汁,无毛。叶 3—4 枚轮生,稀对生,薄纸质,倒卵状长圆形至宽椭圆形,长 8—15 厘米,宽 3—5 厘米,先端钝或短渐尖,基部渐狭成楔形;侧脉几平行,极密;叶柄长 1.5—2 厘米。伞房状聚伞花序生于最高的叶腋内;无花梗;花萼裂片卵状长圆形,先端钝,中间增厚,长约 2 毫米;花冠筒细长,长约 1 厘米,裂片线形,长 6 毫米;花药披针形,先端锐尖;花盘不显著。核果鲜时红色,渐尖,长 2—4 厘米,直径约 1 厘米;种子近圆形,有狭的边缘。花期 9 月。

我国台湾古城和广东沿海岛屿有栽培。原产澳大利亚的昆士兰及其南部岛屿。