

丝顶端膨大;花盘环状,高达子房之半;子房一半埋藏在花盘内,高1毫米,花柱柔弱,长9毫米,柱头棒状,基部具一环状的膜。核果红色,离生,椭圆形,长9毫米,直径7毫米。花期2—11月,果期9月—翌年2月。

云南和广东(海南)等省有栽培。产于马来西亚和泰国。模式标本采自马来西亚的霹雳地区。

7. 台湾萝芙木(广东林学院研究报告)

Rauvolfia taiwanensis Tsiang, 广东林学院研究报告, 1:12, 图版 7. 1962.

粗壮灌木,除花冠筒内面被长柔毛外,其余皆无毛;茎灰白色,皮孔稀少,直径6毫米;节间长2—3厘米。叶腋间与叶腋内有腺体,淡黄色,钻状,约长1毫米。叶对生、三叶或四叶轮生,椭圆形或椭圆状长圆形,两端短渐尖,长7.5—11.5厘米,宽2.1—3.5厘米;中脉和侧脉在叶面扁平,在叶背微凸起;叶柄长1.5—2厘米。伞形式聚伞花序;总花梗6条,全部在小枝上部腋间生出,粗壮,长达15厘米,比叶为长;初生总花梗长5—8.5厘米,次生的长1—5厘米,第三级长约1.5厘米;苞片和小苞片卵圆状,渐尖,长约1毫米;花萼钟状,裂片长1.5毫米;花冠白色,花冠筒圆筒状,中部膨大,长7.5毫米,裂片广椭圆形,长2.3毫米,宽2毫米;雄蕊着生于花冠筒的中部,花药背部着生;花盘环状,长约子房之半;子房由2个离生心皮所组成,花柱圆柱状,柱头球状,基部无环状薄膜。核果未成熟略呈黑色,斜椭圆体,长1厘米,直径4毫米。花期9—10月,果期12月。

产于我国台湾。生于山地丛林中。模式标本采自台中大甲街铁钻山。

8. 矮青木(广东林学院研究报告)

Rauvolfia brevistyla Tsiang, 广东林学院研究报告, 1:9, 图版 4. 1962.

灌木,高1米,除花冠筒内被长柔毛外,其余皆无毛;茎麦秆色,节间长2—4厘米;叶腋间和叶腋内具小腺体,淡黄色。通常为三叶轮生,窄披针形,两端尾状渐尖,顶部急尖,长3.5—10厘米,宽0.5—1.8厘米;侧脉不明显,约15对;叶柄长5—10毫米。聚伞花序生于上部小枝腋间,伞形,比叶为短;花小,稀疏;花萼钟状,裂片镊合状排列;花冠白色,花冠筒细,中间膨大,长7毫米,裂片短,广椭圆形或近方形,长1毫米,宽0.5毫米;雄蕊柔弱;花盘环形,顶端呈微波状;花柱极短,仅长0.5毫米,柱头棒状。花期第一次2—5月,第二次7—10月;果期第一次5—8月,第二次9月至翌春。

产于广东南部。生于林荫下。模式标本采自中山县三灶岛。

9. 萝芙木(植物学名词审查本) 萝芙藤(中国树木分类学); 鸡眼子、染布子、白