

浅灰色短柔毛,内面基部无腺体;花冠白色,高脚碟状,外面被浅灰色微柔毛,内面在雄蕊着生处以下被长柔毛,花冠筒圆筒状,长6毫米,中部以上膨大,花冠裂片卵圆形,急尖,长2毫米,宽1.7毫米,向左覆盖;雄蕊着生于花冠筒的喉部;子房由2枚离心皮所组成,无毛,胚珠每室3个,2排,花柱丝状,柱头长圆形,被毛茸。花期9月。

产于云南南部。生于海拔1950米山地密林中。模式标本采自云南景洪大勐龙。

3. 长序链珠藤(中国高等植物图鉴)

Alyxia yunkuniana Tsiang in Sunyatsenia 2: 107, tab. 22. 1934.

粗壮攀援灌木;茎皮暗褐色,平滑无毛,而有瘤状突起。叶对生或3叶轮生,近革质,椭圆状长圆形或长圆状披针形,长7—13厘米,宽3—4.5厘米,端部短渐尖或镰刀状急尖,基部楔形,边缘外卷;中脉在叶面凹陷,在叶背凸起,侧脉多数,近平行,柔细,在叶面不明显,在叶背凸出;叶柄上面具浅槽,长约1厘米;腋间及腋内的腺体早落,线形,长1毫米。圆锥状聚伞花序顶生或近顶生,每个聚伞有花2—4朵;总花梗被白色微柔毛,三歧长约10.5厘米;花梗长1—1.5毫米,被白色微柔毛;小苞片卵圆形,长2毫米,急尖,被白色微柔毛;花蕾钝头;花萼裂片为双盖覆瓦状排列,外面被白色微绒毛,内面无毛,裂片分离至近基部,龙骨状或卵状三角形,短渐尖,长1毫米,内面无腺体;花冠高脚碟状,无毛,花冠筒长2毫米,直径1.5毫米,喉部无鳞片,花冠裂片向左覆盖,斜卵圆形,钝头,长1毫米,宽1.5毫米;雄蕊5个,着生在花冠筒的中部以上,花药与柱头分离,顶端达到喉部,但不伸出,长圆状披针形,药室基部近圆形,长约0.5毫米;无花盘;子房具二个心皮,被短柔毛,花柱丝状,长1.5毫米,柱头近头状,顶端为喙状突出。核果椭圆形或卵状长圆形,长3厘米,直径1.2厘米,黑色,具柄(柄长1毫米),腹面具条纹;子叶红色。花期5—7月,果期7—12月。

产于广东、广西及云南。生于海拔250—1000米的山谷、溪旁、石上或密林下疏荫潮湿或润湿地方。模式标本采自广东信宜。

4. 兰屿链珠藤(新拟)

Alyxia insularis Kanehira et Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Form. 24: 402, f. 4. 1934; H. L. Li, Wood. Fl. Taiwan 782. f. 313. 1963.

攀援灌木,无毛;枝粗壮,具四稜。叶通常4枚轮生,厚革质,倒卵形至倒卵状长圆形,长达7厘米,宽3厘米,顶端钝,基部急尖至楔形,边缘略反卷;中脉在叶面凹陷,侧脉两面不明显;叶柄长达15毫米。聚伞花序腋生;花序梗短;花梗基部具有很多小苞片;花萼5深裂,裂片卵状三角形,具缘毛;花冠高脚碟状,除花冠筒内面中部具柔毛外无毛,花冠裂片卵圆形;雄蕊着生于花冠筒中部之上,花药内藏;子房被短柔

毛,花柱丝状,柱头圆形。果序腋生,长达5厘米;核果椭圆形,长20毫米,直径12毫米,具细尖头及短柄,在中间紧缩。花期5月。

产于我国台湾。模式标本采自台湾兰屿。

5. 乐东链珠藤(植物分类学报)

Alyxia lehtungensis Tsiang in Acta Phytotax. Sinica 10: 30. Pl. 7. 1965; 海南植物志, 3:227. 1974.

攀援灌木,除花外其余均无毛;小枝具稜,老枝圆柱状,有稀少皮孔。叶近革质,对生,倒卵形,长4—7.7厘米,宽2—3.5厘米,顶端钝,基部宽楔形,叶面深绿色,干时黑褐色,叶背浅绿色;中脉在叶面凹陷,在叶背凸起,侧脉不明显。花小,2—3朵组成聚伞花序;花梗长1—2毫米,被疏柔毛;苞片卵圆形;萼片外面无毛,边缘有稀疏短柔毛,长卵圆形,长2毫米,宽0.8毫米;花冠高脚碟状,花冠裂片向左覆盖,长卵圆形,长1.5毫米,宽1毫米,花冠筒圆筒形,在雄蕊着生处膨大,内面被短柔毛,长3毫米,宽1.5毫米;雄蕊着生在花冠筒的中部,花丝短;雌蕊长1.5毫米,子房密被短柔毛,花柱圆柱状,柱头长圆形,顶端全缘,被毛。核果长卵圆形,长约1.5厘米,直径约0.7厘米。花期3—5月,果期6—8月。

产于广东海南。生于山腰密林中。模式标本采自海南乐东番阳洞。

6. 链珠藤(中国高等植物图鉴) 阿利藤(中国树木分类学);满山香、鸡骨香、过山香、春根藤(广东);过滑边、山红来、瓜子英(福建),瓜子藤(广东、广西) 图版22

Alyxia sinensis Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. 4: 334. 1852; Benth. Fl. Hongkong. 219. 1861; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 24: 95. 1889; Dunn et Tutchter in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. 10: 168. 1912; Merr. In Lingnan Sci. Journ. 5: 149. 1927; Tsiang in Sunyatsenia 2: 104. 1934; 中国高等植物图鉴, 3:426, 图4806. 1974.

藤状灌木,具乳汁,高达3米;除花梗、苞片及萼片外,其余无毛。叶革质,对生或3枚轮生,通常圆形或卵圆形、倒卵形,顶端圆或微凹,长1.5—3.5厘米,宽8—20毫米,边缘反卷;侧脉不明显;叶柄长2毫米。聚伞花序腋生或近顶生;总花梗长不及1.5厘米,被微毛;花小,长5—6毫米;小苞片与萼片均有微毛;花萼裂片卵圆形,近钝头,长1.5毫米,内面无腺体;花冠先淡红色后退变白色,花冠筒长2.3毫米,内面无毛,近花冠喉部紧缩,喉部无鳞片,花冠裂片卵圆形,长1.5厘米;雌蕊长1.5毫米,子房具长柔毛。核果卵形,长约1厘米,直径0.5厘米,2—3颗组成链珠状。花期4—9月,果期5—11月。