

毛,花柱丝状,柱头圆形。果序腋生,长达5厘米;核果椭圆形,长20毫米,直径12毫米,具细尖头及短柄,在中间紧缩。花期5月。

产于我国台湾。模式标本采自台湾兰屿。

5. 乐东链珠藤(植物分类学报)

Alyxia lehtungensis Tsiang in Acta Phytotax. Sinica 10: 30. Pl. 7. 1965; 海南植物志, 3:227. 1974.

攀援灌木,除花外其余均无毛;小枝具稜,老枝圆柱状,有稀少皮孔。叶近革质,对生,倒卵形,长4—7.7厘米,宽2—3.5厘米,顶端钝,基部宽楔形,叶面深绿色,干时黑褐色,叶背浅绿色;中脉在叶面凹陷,在叶背凸起,侧脉不明显。花小,2—3朵组成聚伞花序;花梗长1—2毫米,被疏柔毛;苞片卵圆形;萼片外面无毛,边缘有稀疏短柔毛,长卵圆形,长2毫米,宽0.8毫米;花冠高脚碟状,花冠裂片向左覆盖,长卵圆形,长1.5毫米,宽1毫米,花冠筒圆筒形,在雄蕊着生处膨大,内面被短柔毛,长3毫米,宽1.5毫米;雄蕊着生在花冠筒的中部,花丝短;雌蕊长1.5毫米,子房密被短柔毛,花柱圆柱状,柱头长圆形,顶端全缘,被毛。核果长卵圆形,长约1.5厘米,直径约0.7厘米。花期3—5月,果期6—8月。

产于广东海南。生于山腰密林中。模式标本采自海南乐东番阳洞。

6. 链珠藤(中国高等植物图鉴) 阿利藤(中国树木分类学);满山香、鸡骨香、过山香、春根藤(广东);过滑边、山红来、瓜子英(福建),瓜子藤(广东、广西) 图版22

Alyxia sinensis Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. 4: 334. 1852; Benth. Fl. Hongkong. 219. 1861; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 24: 95. 1889; Dunn et Tutchter in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. 10: 168. 1912; Merr. In Lingnan Sci. Journ. 5: 149. 1927; Tsiang in Sunyatsenia 2: 104. 1934; 中国高等植物图鉴, 3:426, 图4806. 1974.

藤状灌木,具乳汁,高达3米;除花梗、苞片及萼片外,其余无毛。叶革质,对生或3枚轮生,通常圆形或卵圆形、倒卵形,顶端圆或微凹,长1.5—3.5厘米,宽8—20毫米,边缘反卷;侧脉不明显;叶柄长2毫米。聚伞花序腋生或近顶生;总花梗长不及1.5厘米,被微毛;花小,长5—6毫米;小苞片与萼片均有微毛;花萼裂片卵圆形,近钝头,长1.5毫米,内面无腺体;花冠先淡红色后退变白色,花冠筒长2.3毫米,内面无毛,近花冠喉部紧缩,喉部无鳞片,花冠裂片卵圆形,长1.5厘米;雌蕊长1.5毫米,子房具长柔毛。核果卵形,长约1厘米,直径0.5厘米,2—3颗组成链珠状。花期4—9月,果期5—11月。