

分布于浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、贵州等省区。常野生于矮林或灌木丛中。模式标本采自广东南部岛屿。

根有小毒,具有解热镇痛、消痈解毒作用。民间常用于治风火、齿痛、风湿性关节痛、胃痛和跌打损伤等。全株可作发酵药。

#### 7. 贵州链珠藤(植物分类学报)

***Alyxia kweichowensis*** Tsiang et P. T. Li in *Acta Phytotax. Sinica* **11**: 360, Pl. 41. 1973.

攀援灌木,除花序外其余无毛;小枝粉绿色,具小瘤状凸起,节间长2—2.5厘米;老枝灰色,节间长3.5—6.5厘米;叶腋内或腋间具小腺体,腺体黑色,钻状,长约0.5毫米。叶坚纸质,对生,稀3叶轮生,椭圆形,稀为椭圆状长圆形,长3.5—6厘米,宽1—2.6厘米,两端均短渐尖,钝头,叶缘波状;中脉在叶面微凹,在叶背凸起,侧脉在叶面明显,在叶背不明显;叶柄长2—3毫米。聚伞花序腋生,单个,二歧或三歧;花序梗长5—20毫米,被灰色长柔毛;小苞片2枚或更多,生在花萼的下部;花萼5深裂,裂片双盖覆瓦状排列,长圆状披针形,长2.5—3毫米,宽1毫米,外面被灰色长柔毛,有缘毛,内面基部无腺体;花冠绿白色,高脚碟状,花冠筒圆筒状,在中部以上膨大,长3毫米,花冠裂片向左覆盖,广椭圆形,长1.5毫米,宽1.2毫米,顶端近圆形;雄蕊着生于花冠筒中部以上,花药长圆形,药室基部圆形;子房由2枚离生心皮组成,被长柔毛,花柱圆柱状,柱头顶端2裂,被短柔毛;胚珠4个,2排。核果球状椭圆形,长1.3厘米,直径8毫米,顶端急尖。花期7月,果期10月。

产于贵州平塘、册亨。生于海拔350米疏林中。模式标本采自平塘。

#### 8. 陷边链珠藤(中国高等植物图鉴)

***Alyxia marginata*** Pitard in *Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chin.* **3**: 1123. 1933; 中国高等植物图鉴 **3**: 840.1974.

攀援灌木,高1—2米,除花序外其余皆无毛;小枝和枝条暗灰色或黑色,具瘤状凸起;幼嫩小枝的节间长2.5—4.5厘米,老枝的节间长2.5—5厘米。叶对生或3枚轮生,椭圆状披针形,长7—10厘米,宽1.4—2.8厘米,顶端渐尖,基部楔尖,沿叶的边缘有一条下陷的沟;中脉在叶面微凹,在叶背凸起,侧脉多数,在叶面明显,在叶背不明显;叶柄长3—4毫米。花序腋生,长约1厘米,花1—4朵集成伞形花序;小苞片多数而着生在花梗的基部;花萼外面被短柔毛,裂片卵圆形,急尖,长约3毫米,宽与长相等;花冠黄白色,花冠筒长5毫米,内被稠密的短柔毛,裂片卵圆形,长3毫米,宽2.5毫米;雄蕊着生在冠筒中部以上;子房被毛,花柱圆筒状,柱头头状,顶部被毛。核果单