

分布于浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、贵州等省区。常野生于矮林或灌木丛中。模式标本采自广东南部岛屿。

根有小毒,具有解热镇痛、消痈解毒作用。民间常用于治风火、齿痛、风湿性关节痛、胃痛和跌打损伤等。全株可作发酵药。

7. 贵州链珠藤(植物分类学报)

Alyxia kweichowensis Tsiang et P. T. Li in *Acta Phytotax. Sinica* **11**: 360, Pl. 41. 1973.

攀援灌木,除花序外其余无毛;小枝粉绿色,具小瘤状凸起,节间长2—2.5厘米;老枝灰色,节间长3.5—6.5厘米;叶腋内或腋间具小腺体,腺体黑色,钻状,长约0.5毫米。叶坚纸质,对生,稀3叶轮生,椭圆形,稀为椭圆状长圆形,长3.5—6厘米,宽1—2.6厘米,两端均短渐尖,钝头,叶缘波状;中脉在叶面微凹,在叶背凸起,侧脉在叶面明显,在叶背不明显;叶柄长2—3毫米。聚伞花序腋生,单个,二歧或三歧;花序梗长5—20毫米,被灰色长柔毛;小苞片2枚或更多,生在花萼的下部;花萼5深裂,裂片双盖覆瓦状排列,长圆状披针形,长2.5—3毫米,宽1毫米,外面被灰色长柔毛,有缘毛,内面基部无腺体;花冠绿白色,高脚碟状,花冠筒圆筒状,在中部以上膨大,长3毫米,花冠裂片向左覆盖,广椭圆形,长1.5毫米,宽1.2毫米,顶端近圆形;雄蕊着生于花冠筒中部以上,花药长圆形,药室基部圆形;子房由2枚离生心皮组成,被长柔毛,花柱圆柱状,柱头顶端2裂,被短柔毛;胚珠4个,2排。核果球状椭圆形,长1.3厘米,直径8毫米,顶端急尖。花期7月,果期10月。

产于贵州平塘、册亨。生于海拔350米疏林中。模式标本采自平塘。

8. 陷边链珠藤(中国高等植物图鉴)

Alyxia marginata Pitard in *Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chin.* **3**: 1123. 1933; 中国高等植物图鉴 **3**: 840.1974.

攀援灌木,高1—2米,除花序外其余皆无毛;小枝和枝条暗灰色或黑色,具瘤状凸起;幼嫩小枝的节间长2.5—4.5厘米,老枝的节间长2.5—5厘米。叶对生或3枚轮生,椭圆状披针形,长7—10厘米,宽1.4—2.8厘米,顶端渐尖,基部楔尖,沿叶的边缘有一条下陷的沟;中脉在叶面微凹,在叶背凸起,侧脉多数,在叶面明显,在叶背不明显;叶柄长3—4毫米。花序腋生,长约1厘米,花1—4朵集成伞形花序;小苞片多数而着生在花梗的基部;花萼外面被短柔毛,裂片卵圆形,急尖,长约3毫米,宽与长相等;花冠黄白色,花冠筒长5毫米,内被稠密的短柔毛,裂片卵圆形,长3毫米,宽2.5毫米;雄蕊着生在冠筒中部以上;子房被毛,花柱圆筒状,柱头头状,顶部被毛。核果单

生,近球形,外果皮具条纹,有细尖头,长1厘米,直径0.8厘米。花期9月,果期11月。

产于云南富宁。生于海拔150—1800米山地混交林中或石山上。越南也有分布。模式标本采自越南。

9. 富宁链珠藤(植物分类学报)

Alyxia funingensis Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica **11**: 362, Pl. 42. 1973.

藤状灌木,除花序外其余无毛;小枝粗壮,节间长1.5—6.5厘米,直径2—4毫米,具皮孔。叶坚纸质,椭圆状长圆形或倒披针形,长8—13厘米,宽2.5—4厘米(最大的17×5厘米),顶端急尖,基部宽楔形;中脉在叶面凹下,在叶背凸起,侧脉多数,近平行,在叶面明显,在叶背不明显,叶缘具有一条扁平的边脉;叶柄长8—10毫米。聚伞花序腋生,密集,长1—2厘米;花萼5裂,裂片卵状长圆形,顶端急尖,长3.5毫米,宽1.7毫米,外面被微柔毛,有缘毛;花冠白色,高脚碟状,花冠筒外面无毛,内面密被柔毛,在喉部紧缩而中部以上膨大,长10毫米,花冠裂片卵圆形,钝头,长3毫米,宽1.5毫米;雄蕊着生于花冠筒中部以上;子房长0.8毫米,被疏柔毛,花柱丝状,柱头顶端具疏柔毛。核果球状椭圆形,长1.6厘米,直径1.1厘米。花期9—11月,果期11—12月。

产于云南和广西。生于海拔650米的山地密林中或灌木丛中。模式标本采自云南富宁。

10. 筋藤(广东) 坎香藤、藤满山香、三托藤(广西);香藤(广东)

Alyxia levinei Merr. in Philip. Journ. Sci. **15**: 254. 1919; 中国高等植物图鉴 **3**: 427, 图 4807. 1974.

攀援灌木,具乳汁,全株无毛;小枝和老枝皆柔弱,老枝圆柱状,平滑,淡红褐色,节间长2.5厘米;小枝直径1.5毫米或更细,稍具稜角和条纹。叶对生或3叶轮生,椭圆形或长圆形,长5—8厘米,宽2—3厘米,嫩时膜质,老时纸质或近革质,橄榄色,顶端钝或渐尖,基部急尖或稍渐尖;叶面侧脉不明显,向下凹陷;叶柄长4—7毫米。聚伞花序单生于叶腋内,短;总花梗长5毫米或更短,被微柔毛;花萼裂片长圆形,长1.5毫米;花冠白紫色,高脚碟状,花冠筒圆筒状,喉部紧缩,裂片向左覆盖;雄蕊5枚,着生于花冠筒内面中部以上,花药内藏;无花盘;子房由2枚离生心皮组成,花柱丝状,柱头头状。核果椭圆状,长约9毫米。花期3—8月,果期8月—翌年6月。

产于广东和广西。生于海拔250—400米山地疏林下或山谷、水沟旁。模式标本