

生，近球形，外果皮具条纹，有细尖头，长1厘米，直径0.8厘米。花期9月，果期11月。

产于云南富宁。生于海拔150—1800米山地混交林中或石山上。越南也有分布。模式标本采自越南。

#### 9. 富宁链珠藤(植物分类学报)

**Alyxia funingensis** Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica 11: 362, Pl. 42. 1973.

藤状灌木，除花序外其余无毛；小枝粗壮，节间长1.5—6.5厘米，直径2—4毫米，具皮孔。叶坚纸质，椭圆状长圆形或倒披针形，长8—13厘米，宽2.5—4厘米（最大的 $17 \times 5$ 厘米），顶端急尖，基部宽楔形；中脉在叶面凹下，在叶背凸起，侧脉多数，近平行，在叶面明显，在叶背不明显，叶缘具有一条扁平的边脉；叶柄长8—10毫米。聚伞花序腋生，密集，长1—2厘米；花萼5裂，裂片卵状长圆形，顶端急尖，长3.5毫米，宽1.7毫米，外面被微柔毛，有缘毛；花冠白色，高脚碟状，花冠筒外面无毛，内面密被柔毛，在喉部紧缩而在中部以上膨大，长10毫米，花冠裂片卵圆形，钝头，长3毫米，宽1.5毫米；雄蕊着生于花冠筒中部以上；子房长0.8毫米，被疏柔毛，花柱丝状，柱头顶端具疏柔毛。核果球状椭圆形，长1.6厘米，直径1.1厘米。花期9—11月，果期11—12月。

产于云南和广西。生于海拔650米的山地密林中或灌木丛中。模式标本采自云南富宁。

#### 10. 筋藤(广东) 坎香藤、藤满山香、三托藤(广西)；香藤(广东)

**Alyxia levinei** Merr. in Philip. Journ. Sci. 15: 254. 1919; 中国高等植物图鉴3:427, 图4807. 1974.

攀援灌木，具乳汁，全株无毛；小枝和老枝皆柔弱，老枝圆柱状，平滑，淡红褐色，节间长2.5厘米；小枝直径1.5毫米或更细，稍具稜角和条纹。叶对生或3叶轮生，椭圆形或长圆形，长5—8厘米，宽2—3厘米，嫩时膜质，老时纸质或近革质，橄榄色，顶端钝或渐尖，基部急尖或稍渐尖；叶面侧脉不明显，向下凹陷；叶柄长4—7毫米。聚伞花序单生于叶腋内，短；总花梗长5毫米或更短，被微柔毛；花萼裂片长圆形，长1.5毫米；花冠白紫色，高脚碟状，花冠筒圆筒状，喉部紧缩，裂片向左覆盖；雄蕊5枚，着生于花冠筒内面中部以上，花药内藏；无花盘；子房由2枚离生心皮组成，花柱丝状，柱头头状。核果椭圆状，长约9毫米。花期3—8月，果期8月—翌年6月。

产于广东和广西。生于海拔250—400米山地疏林下或山谷、水沟旁。模式标本