

采自广东鼎湖山。

茎、叶作药用,民间有治消肿、止痛、抽筋、风湿等。

11. 尖叶链珠藤(中国高等植物图鉴)

Alyxia acutifolia Tsiang in Sunyatsenia 3: 135. 1936.

攀援灌木,高2米,全株无毛;树茎皮灰白色;小枝方形,节间长2—2.5厘米。叶革质,对生,在嫩枝的上部为4叶轮生,上升,长圆状披针形或椭圆形,长4—6厘米,宽1.2—2厘米,叶面暗绿色,叶背浅绿色,顶端急尖,基部渐狭而下延至叶柄成楔形,边缘向背面卷;中脉在叶面微凹,在叶背微凸,侧脉不明显;叶柄长约5毫米。花未见。核果单生或2个而成节,圆球形,长约1厘米,直径1厘米,灰白色。花期3—8月,果期9月—翌年5月。

产于广东。生于山地林中。模式标本采自信宜。

12. 长花链珠藤(中国高等植物图鉴)

Alyxia forbesii King et Gamble in Journ. As. Soc. Beng. 74 (2): 420. 1908; Ridley, Fl. Mal. Penins. 2: 334. 1923; Tsiang in Sunyatsenia 3: 136. 1936, 静生汇报, 9: 16. 1939.

蔓延木质藤本,除花序外均无毛;幼嫩的小枝具三稜,老枝成圆柱状;茎皮灰白色,具稀少皮孔;节间长5—8.5厘米。叶坚纸质,对生或3—4叶轮生,披针形,长8—11厘米,宽1.5—2.5厘米,顶端长渐尖,基部楔形,边缘微向背面反卷;中脉在叶面微凹,在叶背凸起,侧脉多数,在叶面明显,在叶背不明显;叶柄长3—5毫米。聚伞花序腋生,长3—5厘米,着花5—6朵;总花梗长1—1.3厘米,被灰色长柔毛;小苞片少数,被灰色长柔毛,与花萼裂片同形;花萼裂片卵圆状披针形,长2毫米,宽1毫米,顶部钝,被灰色长柔毛;花冠黄白色,高脚碟状,花冠筒圆筒状,在雄蕊着生处膨大,喉部紧缩,长8.5毫米,裂片卵圆形,钝头,长4毫米,宽2毫米;雄蕊着生于花冠筒中部之上;雌蕊长8毫米,子房被长柔毛,花柱细长,柱头无毛,顶端2裂。核果长圆状椭圆形,长1.5厘米,直径约0.5厘米。花期5—8月,果期8—10月。

产于云南南部。生于海拔1300米的山谷中。分布于马来西亚和印度尼西亚。模式标本采自马来西亚。

13. 狭叶链珠藤(中国高等植物图鉴)

Alyxia schlechteri Lév. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 9: 453. 1911; Woodson in Journ. Arn. Arb. 15: 316. 1934; Tsiang in Sunyatsenia 2: 105. 1934, op. cit. 3: 136. 1936; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 18: 235. 1937. — *Daphne bodinieri* Lév. l.

c. **13**: 258. 1914.——*Wikstroemia bodinieri* Lév. Fl. Kouy-Tchéou 417. 1915.——*Alyxia bodinieri* Woodson, l. c. **15**: 316. 1934.

蔓延木质藤本，具乳汁，除幼嫩部分和花序外均无毛；小枝被微柔毛，老时渐成无毛，具稠密皮孔；老枝灰白色，直径 1.3 毫米；节间幼嫩时长 1—7 厘米。叶近革质，对生或 3—4 叶轮生，常集在小枝的上部，狭披针形或狭椭圆形，长 2—4 厘米，宽 7—13 毫米（最大的 6×1.5 厘米），顶端渐尖或急尖，基部宽楔形，叶面深绿色，叶背浅绿色，边缘微向外卷；中脉在叶面凹陷，在叶背凸出，侧脉在叶面略可看见，在叶背不明显而光滑；叶柄长 2—4 毫米。花黄色，多朵集成聚伞花序，长 0.5—1 厘米，腋生。核果链珠状，具 2—3 个节，椭圆形，长 7 毫米，直径 5 毫米，紫黑色。果期 12 月至翌年 5 月。

产于贵州、云南及广西等省区。生于海拔 700—1150 米山地疏林中或灌木丛中。模式标本采自贵州。

14. 卫矛叶链珠藤(植物分类学报)

Alyxia euonymifolia Tsiang in Acta Phytotax. Sinica **10**: 28. Pl. 5. 1965; 海南植物志, **3**: 226. 1974.

攀援灌木，除总花梗、小苞片和萼片被微柔毛外，其余均无毛；小枝四棱，老枝圆柱状，有稀少皮孔。叶近革质，在枝上部为 3 叶轮生，在枝下部则为对生，椭圆形，长 2—4 厘米，宽 1—2 厘米（最大者达 6×2.2 厘米），顶端急尖，基部楔形，上面具白霜，下面浅绿色；中脉两面凸起，侧脉不明显；叶柄长 5—8 毫米。花小，组成聚伞花序，顶生或腋生，长约 1 厘米；花萼 5 深裂，萼片卵圆形，钝头，被柔毛，边缘被缘毛，长 1.8 毫米，宽 1.5 毫米；花冠红黄色，高脚碟状，花冠筒圆筒状，长 2.6 毫米，内面无毛，喉部紧缩，在雄蕊着生处膨大，花冠裂片卵圆形，长 1 毫米，宽 0.8 毫米；雄蕊着生在冠筒中部以上，花药长圆形；子房被柔毛；花柱丝状；柱头顶端 2 裂。核果黑紫色，球状椭圆形，长 1.2 厘米，直径 0.8 厘米。花期 6—9 月，果期 8—12 月。

产于广东海南。生于海拔 300 米处的林中。模式标本采自海南保亭。

15. 海南链珠藤(海南植物志) 白骨藤(海南) 图版 23(6—9)

Alyxia hainanensis Merr. et Chun in Sunyatsenia **2**: 309, fig. 41. 1935; Tsiang op. cit. **3**: 136. 1936; 中国高等植物图鉴, **3**: 428, 图 4809. 1974; 海南植物志, **3**: 226, 图 675. 1974.

攀援灌木，除花序外其余均无毛；小枝压扁或方形后成圆形，具稀少皮孔，直径 2—4 毫米；节间长 3—6 厘米（在果枝上可达 16 厘米）。叶对生或 3 叶轮生，坚纸质，