

椭圆形至长圆形,顶端渐尖,稀钝头,基部急尖或近圆形,边缘微向外卷,长4—12厘米,宽2.5—4.5厘米;中脉在叶面微凹,在叶背凸起,侧脉多数,在叶面可见,在叶背不明显;叶柄长3—8毫米。花序腋生或近顶生的花束,或集成短圆锥式的聚伞花序,长1—2厘米;总花梗、花梗、小苞片被灰色短柔毛;花萼裂片长圆状披针形,被短柔毛,具缘毛,长1.8毫米;花冠黄绿色,两面无毛,花冠筒圆筒状,在上端膨大,在花喉处收缩,长3.8毫米,裂片卵圆形,钝头,长1.8毫米,宽1.4毫米;雄蕊着生于花冠筒上部膨大的地方;子房具2个分离的心皮,被疏长柔毛,长1.6毫米,花柱丝状,柱头无毛,顶端2裂。核果近球形,通常长圆状椭圆形,有时弯曲,通常具1—3个关节,长9—22毫米,直径5—7毫米。花期8—10月,果期12月—翌年4月。

产于广东、广西、四川等省区。生于海拔250—950米山地疏林下或山谷、路旁较荫湿的地方。模式标本采自广东崖县。

16. 茉莉链珠藤(植物分类学报)

Alyxia jasminea Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica **11**: 362, Pl. 43. 1973.

攀援灌木,除小枝和花序外其余无毛;小枝压扁状,被微柔毛,后脱落成无毛,节间长2—3厘米。叶椭圆形或椭圆状长圆形,长2—7厘米,宽1—2厘米,顶端渐尖,基部楔形,边缘微向外卷;中脉在叶面微凹,在叶背稍凸起,侧脉在叶的两面均不明显;叶柄长约5毫米。聚伞花序生于小枝顶端的叶腋内,长1.5—2厘米,着花2—3朵;花序梗长3毫米;小苞片被微柔毛,与花萼裂片同形;花萼裂片卵圆形,顶端尖,长1.7毫米,外被微柔毛,边缘具缘毛;花冠高脚碟状,长10毫米,花冠筒长6毫米,外面无毛,内面被长柔毛,花冠裂片长卵形,长4毫米,宽3.2毫米;雄蕊着生于花冠筒的中部,花药卵状披针形,长1.6毫米;子房被疏柔毛,花柱丝状,柱头顶端2裂,基部膨大。核果椭圆形,长约1.3厘米,直径6毫米。花期8—10月,果期10—12月。

产于云南南部。生于海拔1940米山地密林潮湿处。模式标本采自云南屏边。

17. 串珠子(植物分类学报) 图版23(1—5)

Alyxia vulgaris Tsiang in Acta Phytotax. Sinica **10**: 29. Pl. 6. 1965; 中国高等植物图鉴, **3**:428, 图4810. 1974; 海南植物志, **3**:227. 1974.

蔓延藤状灌木;小枝具稠密的皮孔,老时枝条具稀瘤;节间长1.5—4厘米。叶对生或3叶轮生,厚坚纸质,椭圆形或长圆形至椭圆状披针形,长3—7厘米,宽1.3厘米(最大者达7.7×4.1厘米),顶端急尖稀短渐尖,叶面深绿色,叶背浅绿色;叶面中脉和侧脉扁平,叶背中脉凸起,侧脉微隆起;叶柄长0.3—1厘米。花小,淡黄绿色,组