

椭圆形至长圆形,顶端渐尖,稀钝头,基部急尖或近圆形,边缘微向外卷,长4—12厘米,宽2.5—4.5厘米;中脉在叶面微凹,在叶背凸起,侧脉多数,在叶面可见,在叶背不明显;叶柄长3—8毫米。花序腋生或近顶生的花束,或集成短圆锥式的聚伞花序,长1—2厘米;总花梗、花梗、小苞片被灰色短柔毛;花萼裂片长圆状披针形,被短柔毛,具缘毛,长1.8毫米;花冠黄绿色,两面无毛,花冠筒圆筒状,在上端膨大,在花喉处收缩,长3.8毫米,裂片卵圆形,钝头,长1.8毫米,宽1.4毫米;雄蕊着生于花冠筒上部膨大的地方;子房具2个分离的心皮,被疏长柔毛,长1.6毫米,花柱丝状,柱头无毛,顶端2裂。核果近球形,通常长圆状椭圆形,有时弯曲,通常具1—3个关节,长9—22毫米,直径5—7毫米。花期8—10月,果期12月—翌年4月。

产于广东、广西、四川等省区。生于海拔250—950米山地疏林下或山谷、路旁较荫湿的地方。模式标本采自广东崖县。

16. 茉莉链珠藤(植物分类学报)

Alyxia jasmineea Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica 11: 362, Pl. 43. 1973.

攀援灌木,除小枝和花序外其余无毛;小枝压扁状,被微柔毛,后脱落成无毛,节间长2—3厘米。叶椭圆形或椭圆状长圆形,长2—7厘米,宽1—2厘米,顶端渐尖,基部楔形,边缘微向外卷;中脉在叶面微凹,在叶背稍凸起,侧脉在叶的两面均不明显;叶柄长约5毫米。聚伞花序生于小枝顶端的叶腋内,长1.5—2厘米,着花2—3朵;花序梗长3毫米;小苞片被微柔毛,与花萼裂片同形;花萼裂片卵圆形,顶端尖,长1.7毫米,外被微柔毛,边缘具缘毛;花冠高脚碟状,长10毫米,花冠筒长6毫米,外面无毛,内面被长柔毛,花冠裂片长卵形,长4毫米,宽3.2毫米;雄蕊着生于花冠筒的中部,花药卵状披针形,长1.6毫米;子房被疏柔毛,花柱丝状,柱头顶端2裂,基部膨大。核果椭圆形,长约1.3厘米,直径6毫米。花期8—10月,果期10—12月。

产于云南南部。生于海拔1940米山地密林潮湿处。模式标本采自云南屏边。

17. 串珠子(植物分类学报) 图版23(1—5)

Alyxia vulgaris Tsiang in Acta Phytotax. Sinica 10: 29. Pl. 6. 1965; 中国高等植物图鉴, 3:428, 图4810. 1974; 海南植物志, 3:227. 1974.

蔓延藤状灌木;小枝具稠密的皮孔,老时枝条具稀瘤;节间长1.5—4厘米。叶对生或3叶轮生,厚坚纸质,椭圆形或长圆形至椭圆状披针形,长3—7厘米,宽1.3厘米(最大者达7.7×4.1厘米),顶端急尖稀短渐尖,叶面深绿色,叶背浅绿色;叶面中脉和侧脉扁平,叶背中脉凸起,侧脉微隆起;叶柄长0.3—1厘米。花小,淡黄绿色,组

成聚伞花序，腋生，长 0.5—1 厘米；小苞片多数，具白色柔毛；萼片外面具白色长柔毛，钝头，边缘具缘毛，长 2 毫米，宽 1 毫米；花冠高脚碟状，花冠筒圆筒形，外面无毛，内面被稠密短柔毛，长 1.5 厘米，花冠裂片卵圆形，钝头，长和宽约相等；雄蕊着生在花冠筒中部以上；子房被长柔毛，花柱丝状，柱头全缘，长圆形，被长柔毛。核果球状椭圆形，顶端急尖，长 1.2 厘米，直径 0.8 厘米。花期 3—8 月，果期 6 月—翌年 2 月。

产于广西、广东、湖南、四川等省区。生于海拔 170—1360 米的山谷、山腰、平地、路旁、溪边的疏林中。模式标本采自广西瑶山。

18. 毛叶链珠藤(植物分类学报) 图版 24

Alyxia villilimba C. Y. Wu ex Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica **11**: 366, Pl. 45. 1973.

灌木，高 3 米，除老叶面及果实外，全株密被短柔毛。茎直径 3 毫米，节间长 1.5—3.5 厘米。叶通常 3 枚轮生，纸质，椭圆形至椭圆状披针形，长 7—9.5 厘米，宽 1.5—2.5 厘米，顶端渐尖，基部楔形，幼时叶面被短柔毛，老渐无毛，叶背密被短柔毛；中脉在叶面凹陷，在叶背凸起，侧脉每边约 30 条，近平行，网脉不明显；叶柄长 1 厘米。聚伞花序被柔软的短柔毛，腋生，着花多朵，组成穗状圆锥式花序；花序梗比叶柄长 2 倍，长 2—4 厘米；苞片和小苞片卵圆形，急尖；花冠白色，高脚碟状，长 1.5 毫米，外面被白色毛，花冠筒中部膨大，花冠裂片向右覆盖，卵圆形，钝头，长宽均约 0.5 毫米；雄蕊着生花冠筒中部，花丝短，花药披针形；子房卵球状，花柱短，柱头头状，无毛。核果椭圆状，长 2.5 厘米，直径 1 厘米；种子黑色。花期 5 月。

产于云南东南部。生于石灰山林内较湿润的地方。模式标本采自西畴。

3. 黄蝉族——Trib. Allemandeae A. DC.

A. DC. Prodr. **8**: 318. 1844 (ut subtrib.).

子房由单生心皮所组成，1 室；果为蒴果，外果皮具长刺。


本族我国栽培 1 属

11. 黄蝉属*——*Allemanda* Linn.

Linn. Mant. **2**: 146. 1771.

直立或藤状灌木。叶轮生、对生，稀互生，叶腋内常有腺体。花大形，黄色或紫色，

* 黄蝉属(种子植物名称)。



图版 23 1—5. 串珠子 *Alyxia vulgaris* Tsiang, 1.花枝; 2.花蕾; 3.花冠一部分, 展开示雄蕊着生位置; 4.雌蕊; 5.核果。6—9. 海南链珠藤 *Alyxia hainanensis* Merr. et Chun, 6.花蕾; 7.花冠展开示雄蕊着生位置; 8.雌蕊; 9.核果。(吴翠云仿绘)