

Dombr. Fl. Mag. 5: t. 263. 1866; Tsiang in Sunyatsenia 2: 93. 1934.

叶纸质,椭圆形、卵圆形或倒卵形。花序着花4—5朵;花萼裂片叶片状,椭圆形至卵圆形,长1—2厘米,宽0.3—1厘米;花冠比原变种大形,橙黄色,长10—14厘米,直径9—14厘米,花冠喉部具5个发亮的斑点。花期春夏两季为盛,有时秋季亦能开花;果期冬季至翌年春季。

栽培于广东、福建和台湾等省的庭园中。原产南美洲的乌拉圭,现广植于热带和亚热带地区。

花橙黄色,大而美丽,供观赏用。

4. 鸡蛋花族——Trib. Plumerieae A. DC.

A. DC. Prodr. 8: 345. 1844.

子房由2个离生心皮所组成,胚珠在内侧着生;种子无毛,顶端具膜翅。

本族我国产4属。

12. 鸡蛋花属* ——*Plumeria* Linn.

Linn. Sp. Pl. 209. 1753, et Gen. Pl. 5: 99. 1754.

小乔木;枝条粗而带肉质,具乳汁,落叶后具有明显的叶痕。叶互生,大形,具长柄,羽状脉。聚伞花序顶生,二至三歧;苞片通常大形,开花前脱落;花萼小,5裂,双盖覆互状排列,内面基部无腺体;花冠漏斗状,红色或白色黄心,花冠筒圆筒形,喉部无鳞片,裂片5,在花蕾时向左覆盖;雄蕊着生在冠筒的基部,花丝短,花药长圆形,钝头,内藏,基部圆,与柱头分离;无花盘;子房由2枚离生心皮组成,花柱短,柱头长圆形,顶端2裂;每心皮有胚珠多颗,着生在子房腹缝线的胎座上。蓇葖双生,通常广叉,长圆形,顶端渐尖;种子多数,长圆形,倒生,扁平,顶端具膜质的翅,无种毛;子叶长圆形;胚根短。

约7种,原产于美洲热带地区。现广植于亚洲热带及亚热带地区。我国南部、西南部及东部均有栽培1种及1栽培变种。

本属模式种为: *Plumeria rubra* Linn.

1. 红鸡蛋花(广州植物志)

Plumeria rubra Linn. Sp. Pl. 209. 1753; 侯宽昭等,广州植物志, 486. 1956

* 鸡蛋花属(种子植物名称),别名缅梔子属(中国树木分类学)。