

毫米;花蕾端部长圆状急尖;花萼基部内面有腺体,萼片长圆形,边缘有缘毛,长3毫米,宽2毫米;花冠白色,花冠筒长达2厘米;雄蕊着生于花冠筒中部之下;花柱长11毫米,柱头倒卵球形。蒴果长2.5—7厘米,极叉开或外弯;种子3—6个,长圆形。花期6—11月,果期秋季。

云南南部野生;广西、广东和台湾等省区栽培。印度也有,现广泛栽培于亚洲热带和亚热带地区。模式标本采自印度。

1a. 狗牙花(植物分类学报) 白狗牙、狮子花、豆腐花(广西) 图版 33

Ervatamia divaricata (L.) Burk. cv. **Gouyahua**; Tsiang in Acta Phytotax. Sinica 8: 249. 1963; 中国高等植物图鉴, 3:433, 图 4819. 1974;; 海南植物志, 3:225. 1974. ——*Tabernaemontana coronaria* Willd. β *flore-pleno*; Lindl. Bot. Reg. 13: tab. 1064. 1827.

花冠重瓣。 花期6—11月,果期秋季。

栽培于我国南部各省区。

叶可药用,有降低血压效能,民间称可清凉解热利水消肿,治眼病、疮疥、乳疮、癫狗咬伤等症;根可治头痛和骨折等。

组 2. 假狗牙花组 Sect. *Pseudervatamia* Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica 11: 371. 1973.

灌木。花冠喉部无腺体;花蕾顶端卵圆状或椭圆状,末端尖。

亚组 1. 海南狗牙花亚组 Subsect. *Insulares* (Tsiang) Tsiang et P. T. Li, stat. nov. ——Sect. *Insulares* Tsiang in Acta Phytotax. Sinica 8: 246. 1963.

本亚组主要特征: 雄蕊生于花冠筒中部以上,顶端到达喉部;花萼裂片卵状椭圆形;三歧聚伞花序。

本亚组中国产3种。

2. 毛叶狗牙花(植物分类学报) 图版 34

Ervatamia puberula Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica 11: 371, Pl. 46. 1973.

灌木;枝条带灰色,无毛,具皮孔,干时有纵条纹,小枝黄绿色,具稜,被短柔毛,节间长2—4厘米,直径2毫米。叶柄内的假托叶半月形,基部扩大而合生,长0.5—1毫米。叶纸质,椭圆形,长5—11厘米,宽1.2—3.5厘米,顶部短渐尖,基部宽楔形至楔形,叶面除中脉被短柔毛外无毛,叶背密被短柔毛;中脉和侧脉在叶面扁平,在叶背凸



图版 33 狗牙花 *Ervatamia divaricata* (L.) Burk. cv. Gouyahua, 1.花枝; 2.蓇葖。
(李秉滔绘)