

痛,乳痈,疖肿,跌打瘀痛等。

4. 徽江狗牙花(植物分类学报)

Ervatamia chengkangensis Tsiang in Acta Phytotax. Sinica 8: 247, Pl. 32(1). 1963.

灌木,全株无毛;枝和小枝灰绿色,干时具纵条纹,节间长7—10厘米。叶膜质,椭圆形或椭圆状长圆形,端部尾状渐尖,尖头常作镰刀状,基部楔形,叶面深绿色,背面淡绿色,长9—12.8厘米,宽4—5厘米;侧脉10—13对,上面扁平,背面略凸起;叶柄长0.5厘米。假托叶腋生,卵形,基部合生,长约2毫米。聚伞花序腋生,通常双生,比叶短一倍,有花6—8朵;总花梗;第一级长3.5厘米,二级长1—1.2厘米,三级0.5—1厘米;苞片和小苞片卵形,长约1毫米;花蕾圆筒状,端部急尖;花萼内面基部有腺体,萼片卵形,长2毫米,宽2毫米;花冠黄色,花冠筒长9毫米,裂片斜倒三角形,基部很狭,长6.3毫米,宽4.5毫米;雄蕊着生于花冠筒中部,达到喉部,花药基部叉开;子房和花柱特征与属同,柱头倒心形,端部微缺。花期4月。

产云南东南部。生于山地林中。模式标本采自徽江。

亚组2. 扇形花亚组 Subsect. Flabelliformes (Tsiang) Tsiang et P. T. Li, stat. nov.——Sect. *Flabelliformes* Tsiang in Acta Phytotax. Sinica 8: 248. 1963.

本亚组主要特征:雄蕊生于花冠筒的1/3长度处;花萼裂片披针形;花冠裂片扇形;花单生或几朵组成聚伞花序。

本亚组中国产1种。

5. 扇形狗牙花(植物分类学报)

Ervatamia flabelliformis Tsiang in Acta Phytotax. Sinica 8: 248, Pl. 32(2). 1963.

灌木,高达1米,具乳汁,全株无毛;枝和小枝淡灰色,有皮孔,干时有纵的条纹;节间长1—10厘米。假托叶早落,卵圆形,基部扩大而合生,长约1毫米。叶早落,常聚生于上部小枝的顶端,椭圆状长圆形,短渐尖,端部短尖,基部楔形,长3.5—4.5厘米,宽1—1.7厘米(最大6×2厘米),除中脉外扁平;侧脉8—10对;叶柄长5—10毫米。聚伞花序腋生或假顶生,单花或双花,无总花梗或长不超过5毫米;小苞片卵形,长1毫米;花蕾圆筒状,急尖;花萼内面基部多腺体,萼片长4毫米;花冠白色,花冠筒长20毫米,花冠裂片近四方状三角形,基部近镊合状,顶端覆瓦状排列,长宽均13毫米;雄蕊着生于花冠筒的近基部,比花冠筒短三倍,花药线状披针形,基部略叉开;子房长2.5毫米,心皮下部合生,上部分离,向上渐狭,再汇合成短花柱,花柱短圆筒