

状,长 0.8 毫米,柱头 2 深裂,长 1 毫米。蓇葖双生,线状披针形,长 2 厘米,直径 6 毫米。花期 4 月。

产于云南、广西。生于海拔 1000—1600 米山地灌木丛中。模式标本采自云南镇康。

组 3. 圆头花组 Sect. *Pagiantha* (Markgr.) Tsiang et P. T. Li, stat. nov.——*Pagiantha* Markgr. in Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin-Dahlem **12** (115): 546, 549. 1935.

灌木。花冠喉部无腺体;花蕾顶端圆球状,末端圆。

本组中国产 10 种。

亚组 3. 纤花亚组 Subsect. *Graciliflorae* (Markgr.) Tsiang et P. T. Li, stat. nov.——Sect. *Graciliflorae* Markgr. in Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin-Dahlem **12** (115): 547. 1935.——Sect. *Dichotomae* Markgr. l. c. 546.

本亚组主要特征: 蓇葖外果皮不具稜而平滑。

本亚组中国产 8 种。

6. 大陆狗牙花

Ervatamia continentalis Tsiang in Acta Phytotax. Sinica **8**: 243, Pl. 30(2). 1963.

6a. 大陆狗牙花(原变种)

Ervatamia continentalis Tsiang var. ***continentalis***

灌木,高 1—1.5 米,具乳汁,除萼片外余均无毛;枝灰色,小枝暗褐色,有皮孔;节间在老枝上长 6.5—9.5 厘米,在小枝上长 2—6.5 厘米。假托叶早落,基部扩大而合生,卵形,长约 1 毫米。叶开展,纸质,椭圆状长圆形,渐尖,或渐狭成长尾形,向基部楔尖,上面深绿色,背面淡绿色,长 5.5—12 厘米,宽 2—4 厘米;中脉与侧脉在上面和背面均略为凸起,侧脉 10—12 对,弧形上升,与中脉构成 40° — 50° 角,近边缘网结,小脉不明显;叶柄长 3—5 毫米。多歧聚伞花序腋生,与叶近于等长,有花 10—28 朵;总花梗:第一级长 1.5—4 厘米,二级 1—3 厘米,三级 0.3—1 厘米;苞片和小苞片长 0.5 毫米;花蕾圆筒状,端部极钝;花萼内面基部多腺体,腺体狭披针形,基部合生;萼片卵圆形,钝头,边缘具短缘毛,长 3.5 毫米,宽 2 毫米;花冠白色,花冠筒长 20 毫米,近喉部膨大,直径 3 毫米,冠檐略向左旋转,花冠裂片基部近圆形,长圆状镰刀形,长 15 毫米,宽 7 毫米;雄蕊着生于花冠筒中部之上,花药长圆形,钝头,基部叉开;子房长圆形,柱头端部 2 裂。蓇葖双生,通常 180° 叉开,椭圆状长圆形,两端均短渐尖,长 3.5 厘米,直径 1 厘米;种子在每个蓇葖中 2—3 个,不规则三角形,长约 1 厘米,直径 0.5