

厘米。 花期 6—8 月,果期 12 月。

产于广西南部。生于山地林中。模式标本采自防城。

6b. 毛瓣狗牙花(新拟)

Ervatamia continentalis Tsiang var. **pubiflora** Tsiang in Acta Phytotax. Sinica. 8: 244. 1963.

本变种与原变种不同之处在于: 叶端部为尾状长渐尖;花萼内面有多数腺体;花冠裂片外面被细柔毛。 花期 5 月。

产于广西南部。生于山地林中。模式标本采自十万大山。

7. 中国狗牙花(植物分类学报)

Ervatamia chinensis (Merr.) Tsiang in Acta Phytotax. Sinica 8: 244, Pl. 31(1). 1963.——*Tabernaemontana chinensis* Merr. in Philip. Journ. Sci. 21: 507. 1922.

直立灌木,除萼片外,全株无毛;枝草绿色,具不规则条纹,小枝暗褐色,节间长 0.8—2 厘米。假托叶基部扩大而合生,长约 1 厘米。叶纸质,长圆状披针形或狭披针形,端部猝然短渐尖,尖头钝,基部楔形,长 3—7 厘米,宽 1—2 厘米,上面深绿色,背面淡绿色;中脉上面略为陷入,背面凸起,侧脉 8—10 对,略为凸起,小脉不显著;叶柄长 3—5 毫米。花序顶生或腋生,着花通常较少,有时单花或 2 朵;花蕾圆筒状,端部钝;花萼内面近裂片处多腺体,萼片圆形,边缘有缘毛,长和宽为 2 毫米;花冠白色,花冠筒长 20 毫米,近中部胀大,花冠裂片长圆状镰刀形,端部钝,长 16 毫米,宽 7 毫米;雄蕊伸到花冠筒的中部,花药披针形,两端急尖;子房长圆形,花柱丝状,柱头 2 裂。蓇葖通常单生,近卵球形,近无柄,端部有短喙,长 20 毫米(喙包含在内),直径 8 毫米;种子在每个蓇葖内 1—2 个。 花期 7 月,果期 7 月。

产于云南、广西南部。生于山地林中。模式标本采自广西东兴。

8. 大果狗牙花(中国高等植物图鉴) 图版 36

Ervatamia macrocarpa (Jack) Merr. in Journ. Arn. Arb. 33: 246. 1952; 中国高等植物图鉴, 3: 434, 图 4821. 1974.——*Tabernaemontana macrocarpa* Jack in Malay. Misc. 2 (7): 80. 1822.——*Pagiantha macrocarpa* (Jack) Markgr. in Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin-Dahlem 12 (115): 546. 1935.

直立灌木,具乳汁;枝条无毛。叶对生,宽卵形,长 7—11.5 厘米,宽 4—5.5 厘米,两端圆形,无毛。聚伞花序比叶为短,长 4—5 厘米;萼片宽卵形,无毛,内有腺体;花蕾顶端圆球形;花冠内外均无毛;花冠裂片长圆形,花冠筒圆筒状,长约 9 毫米,喉部膨大;雄蕊生在花冠筒近喉部,花药伸到喉部,长圆形,花丝丝状;柱头长圆形,顶端渐