

nov.—Sect. *Corymbosae* Markgr. in Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin-Dahlem **12** (115): 546. 1935.—Sect. *Stenopetalae* Markgr. l. c. 548.

本亚组主要特征：蓇葖外果皮具棱角。

本亚组中国产 2 种。

14. 尖果狗牙花(中国高等植物图鉴)

Ervatamia mucronata (Merr.) Markgr. in Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin-Dahlem **12**: (115) 548. 1935.—*Tabernaemontana mucronata* Merr. in Philipp. Journ. Sci. **4**: 318. 1909.

灌木，除嫩枝有微毛外，其余无毛。叶宽椭圆形至卵圆状长圆形，长 10—16 厘米，宽 4.5—5.5 厘米，先端渐尖，基部楔形；侧脉 11—13 对，弧形上升，至边缘网结；叶柄长 0.5—1 厘米。圆锥状聚伞花序腋生，长 12 厘米；花蕾顶端圆形；花长 1.5 厘米。蓇葖长椭圆形，具短尖头，长 2.5—3.5 厘米，直径约 1 厘米，外果皮淡灰色，有直纵稜 5 条；种子约 10 个，多角形或成熟时呈长圆形，长约 5 毫米。

广东南部栽培。原产菲律宾。

15. 台湾狗牙花(中国高等植物图鉴)

Ervatamia pandacaqui (Poir.) Pichon in Mem. Mus. Hist. Nat. Paris s. n. **27**: 220. 1948.—*Tabernaemontana pandacaqui* Poir. Encycl. Meth. Bot. **7**: 529. 1806.—*Pagiantha pandacaqui* (Poir.) Markgr. in Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin-Dahlem **12**: (115): 546. 1935.

灌木，高约 1 米，全株无毛。叶椭圆形至椭圆状长圆形，长 5—15 厘米，宽 2—4 厘米，先端短渐尖，基部楔形；叶脉在叶背略为凸起，侧脉 14—16 对；叶柄长 0.5—1 厘米；腋间假托叶卵形合生，长和宽约 1 厘米。聚伞花序腋生，二至三出；花萼双盖覆瓦状排列；花冠白色，花蕾先端圆形，长约 2 厘米，花冠筒圆柱状，裂片向左覆盖；雄蕊着生于花冠筒中部；心皮 2 个离生，胚珠多数。蓇葖叉开，双生，先端具喙，外果皮深褐色，具直纵稜 5 条，长 2—3 厘米，直径 1 厘米；种子多角形，灰黑色，长 7 毫米，直径 5 毫米。

我国台湾台南及广东南部岛屿有栽培。原产菲律宾。

19. 假金桔属*——*Rejoua* Gaud.

Gaud. in Freyc. Voy. Uran. Bot. 451, t. 61. 1826.

直立灌木或小乔木；枝条短，圆筒形，具乳汁。叶腋内具假托叶；叶对生，具柄，羽

* 假金桔属(中国高等植物图鉴)。