

状脉。聚伞花序；花萼5裂，裂片半圆形，较厚；花蕾椭圆形，顶端尖；花冠高脚碟状，花冠筒圆筒形，基部膨大，裂片5枚，向左覆盖；雄蕊5枚，着生在花冠筒基部或近基部；花药长圆形，基部具耳，花丝短，花柱短；子房由2枚离生心皮组成，花柱丝状，柱头头状，顶端尖2裂。蓇葖双生，圆形，厚革质；种子无毛。

约5种，分布于非洲西部及西北部和亚洲的斯里兰卡、印度、马来西亚及我国台湾。我国产有1种。

本属模式种为：*Rejoua aurantiaca* Gaud.

假金桔（中国高等植物图鉴）图版38

Rejoua dichotoma (Roxb.) Gamble, Fl. Madras 812. 1923; Alston, Suppl. Fl. Ceylon 191. 1931; 中国高等植物图鉴, 3:435, 图4824. 1974.——*Tabernaemontana dichotoma* Roxb. Hort. Beng. 20. 1814, nom. et Fl. Ind. 2: 21. 1824, descr.——*pagiantha dichotoma* (Roxb.) Markgr. in Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin-Dahlem 12 (115): 546. 1935.

小乔木，枝条短，具乳汁。叶长卵形或长圆形，长7—12厘米，宽3.5—4.5厘米，无毛，叶面绿色，叶背浅绿色，干时黄褐色；侧脉每边约10—12条。聚伞花序着花数朵，萼片半圆形而厚；花冠黄色，高脚碟状，花冠筒长2—2.5厘米，基部膨大，花冠裂片白色，长椭圆状镰刀形，张开时直径5—7.5厘米；雄蕊生在冠筒基部或近基部；心皮离生，柱头顶端2裂。蓇葖双生，圆球形，直径约2厘米。花期6—9月，果期9月—翌年3月。


产于我国台湾兰屿。生于海拔约100米附近热带雨林中。分布于印度和斯里兰卡。模式标本采自印度。

3. 夹竹桃亚科——Subfam. Apocynoideae Woodson

Woodson in Ann. Miss. Bot. Gard. 17: 9. 1930.

雄蕊彼此互相粘合并粘生在柱头上；花药箭头状，顶端渐尖，基部具耳，稀非箭头状；果为蓇葖果；种子顶端具长种毛；花冠裂片通常向右覆盖，稀向左覆盖。

本亚科我国产6族。



图版 38 假金桔 *Rejoua dichotoma* (Roxb.) Gamble, 1.花枝; 2.蓇葖。(吴翠云绘)