

本属模式种为: *Paravallaris macrophylla* Pierre

本属曾被 R. E. Woodson, Jr. 于 1936 年归并到 *Kibatalia* G. Don 属,我们认为是不合理的。因为 *Paravallaris* Pierre ex Hua 属的花冠为高脚碟状,雄蕊着生于花冠筒的喉部,花药完全伸出花喉之外,花丝极短,宽而厚;而 *Kibatalia* G. Don 属的花冠为近漏斗状,花药完全内藏,不伸出花喉之外,花丝丝状,两属的系统位置也相距较远。故本志我们仍保留本属名称。

分 种 检 索 表


1. 叶背、叶柄、果柄无毛…………… 1. 倒缙木 *P. macrophylla* Pierre
1. 叶背、叶柄、果柄被短柔毛…………… 2. 毛叶倒缙木 *P. yunnanensis* Tsiang et P. T. Li

1. 倒缙木(中国高等植物图鉴) 图版 45

Paravallaris macrophylla Pierre in Planch. Prod. Apocyn. 325. 1894, nomen, Hua in Bull. Soc. Bot. France **51**: 273. 1904; Pitard in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine **3**: 1180, f. 132. 1933; C. Y. Wu et W. T. Wang in Acta Phytotax. Sinica **6**: 293. 1957; 中国高等植物图鉴, **3**: 439, 图 4831. 1974. — *Kibatalia macrophylla* (Pierre) Woodson in Philipp. Journ. Sci. **60**: 214. 1936, syn. nov.

灌木或小乔木,高达 6 米,除花外全株无毛;幼枝扁平,棕色或绿色,干时呈黑色,老时成圆形;树皮有细皱纹。叶长圆形或椭圆形,顶端渐尖或猝然成尾状,基部圆形,长 15—35 厘米,宽 9—12 厘米;侧脉 13—19 对,略上升,未到边缘即网结;叶柄长 7—14 毫米,上面有槽。聚伞花序腋生;总花梗长 3—15 毫米,着花 3—10 朵;花梗长 1.5—2.5 厘米,在花期时倒垂;小苞片小,卵圆形,顶端锐尖;花萼裂片卵圆形,长 3 毫米,宽 2—2.5 毫米,边缘略有缘毛,基部内面有小腺体;花冠白色,花冠裂片长圆形,长 12—14 毫米,锐尖,两面被有微毛,广展,在花蕾时向右覆盖,花冠筒圆柱状,基部扩展,在顶端内面有长柔毛;雄蕊着生于花冠筒端部,全部露出,花丝极短,花药长圆形,长 3 毫米,顶端渐尖或锐尖;子房长 1—2.5 毫米,有 2 个离生心皮,花柱柔弱,长 10 毫米,柱头卵圆形,顶端锐尖;胚珠 6 排,每排 7 个。蓇葖线状长圆形,长 8—18 厘米,宽 7—9 毫米;种子倒生,即生于蓇葖的顶端,下垂,扁平,长 18 毫米,宽 2.5—3 毫米,其端部生一尾状喙;种毛白色,绢质,生于喙的四周,长约 4 厘米。花期 5—9 月,果期 11 月—翌年 4 月。

产于云南南部。生于海拔 180—650 米的山坡、疏林中。越南、老挝、柬埔寨也有。模式标本采自越南。



图版 45 倒缙木 *Paravallaris macrophylla* Pierre, 1.花枝; 2.花蕾; 3.花的纵切面; 4.雌蕊及花盘; 5.蓇葖; 6.种子。(李秉滔绘)